

항산화제가 보강된 고함량 기능성 비타민

벤포비타^{100정}

Benfovita 100 Tab.

일반의약품

분류번호: 03160

■ 성분 · 함량 : 1정 중

클린타르타르산염(DAB)	100.0mg
이노시톨(KP)	100.0mg
γ-오리자놀(KP)	10.0mg
벤포티아민(KP)	50.0mg
(티아민염산염으로써 36.15mg)	
리보플라빈(KP)	100.0mg
니코틴산아미드(KP)	100.0mg
폴산(KP)	0.1mg
판토텐산칼슘(KP)	108.7mg
피리독신염산염(KP)	100.0mg
d-비오틴(USP)	0.1mg
시아노코발라민(KP)	0.1mg
아스코르브산과립(별규)	103.1mg
(아스코르브산으로써 100mg)	
유비테카레논(KP)	5.0mg
신화아연(KP)	31.12mg
(아연으로써 25mg)	

첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소, 우유)

■ 성상 : 갈색의 장방형 필름코팅정

■ 효능 · 효과

1. 다음 경우의 비타민 B1, B2, B6, C의 보급

- 육체피로 - 임신 · 수유기 - 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시

- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.

1) 비타민B1(벤포티아민)

- 다음증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등) - 각기 - 눈의 피로

2) 비타민B2(리보플라빈), 비타민B6(피리독신염산염)

- 다음증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

2. 아연의 보급

■ 용법 · 용량 : 만 8세 이상 및 성인 : 1회 1정, 1일 1회 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 2) 만 12개월 미만의 젖먹이

 Kwangdong

3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

1) 만 1세 미만의 젖먹이 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자

3) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)

4) 일부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 5) 심장 · 순환기계기능 장애 환자

6) 신장장애 환자 7) 저단백혈증 환자 8) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종

2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.

3) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.

4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.

5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.

6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

7) 할알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것

8) 우발적으로 과량복용 한 경우 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의사항

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것

3) 각종 요감사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다. 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다.

5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

■ 사용기간 : 제조일로부터 36개월

■ 포장단위 : 60정/병, 120정/병

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 하였거나 유통과정 중 변질 · 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의는 전화070-4346-1213으로 하시기 바랍니다.

※ 본 의약품은 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

※ 본 의약품에 대한 기타 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr/>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.

※ 약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관하여야 합니다.

가정연월일 : 2017년 03월 03일

■ 제조자 : 알리코제약㈜ 충북 진천군 광혜원면 용소2길 21

 알리코제약(주)

■ 제조의뢰자 : ㈜백스팜코리아 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-41

 백스팜코리아

■ 판매자 : 광동제약㈜ 경기도 평택시 산단로 114