

기가프신

연질
캡슐

GIGAPSIN Soft Caps.

진해거담제
가래, 기침가래

10 캡슐

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

L-카르보시스테인(KP)	125 mg
브롬헥신염산염(BP)	2 mg

첨가제(동물유래) : 젤라틴(기원동물 : 소, 사용부위 : 가죽)

[성상]

흰색의 내용물을 함유한 주황색의 타원형 연질캡슐

[효능·효과]

가래, 기침을 유발하는 가래

[용법·용량]

성인 및 15세 이상의 소아 : 1일 3회, 1회 2캡슐을 식후에 경구투여(복용)합니다.
8세~14세 소아 : 1일 3회, 1회 1캡슐을 식후에 경구투여(복용)합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 위 · 십이지장 궤양 환자
- 3) 8세 미만의 소아

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

다른 진해(기침을 그치게 함) · 거담제(가래약), 감기약

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 3) 노인
- 4) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 5) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람

6) 고열 증상이 있는 사람

7) 심장질환, 간질환 또는 중증(심한 증상) 신장(콩팥) 질환의 진단을 받은 사람

8) 위 · 십이지장 궤양의 병력이 있는 사람

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
: 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역구토, 식욕부진, 복통(배아픔), 두통, 혈담
- 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한 증상)증상이 나타난 경우
① 피부점막만증후군(스티븐스-존슨 증후군, 중독성표피괴사용해(리델 증후군) : 고열을 동반하고, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같은 물질이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있습니다.
② 속(아나필락시스): 복용 후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은 땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있습니다.
③ 간기능 장애 : 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨)등이 나타날 수 있습니다.
- 3) 3~4일간 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지켜주세요.
- 2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시키십시오.
- 3) 다음의 증상이 나타날 수 있으므로, 이러한 증상이 계속되거나 심해지는 경우에는 이 약의 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오. 설사, 입안의 건조
- 4) 동물실험에서 브롬헥신염산염을 장기간 다량 연속 투여할 경우 혈청중에 아미노전이효소치와 가래양이 일시적으로 상승했다는 보고가 있습니다.
- 5) 이 약을 복용하면 일시적으로 가래 양이 증가하는 경우가 있습니다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 10캡슐

[판매자] (주)대웅생명과학 / 서울시 송파구 삼전로 42

[제조외뢰자] 슈빌생명과학(주) / 경기도 화성시 양감면 두머리길 16

[제조자] 코스맥스바이오(주) / 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30

※ 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.

※ 이 첨부서 작성일자(2016년 12월 19일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오. ※ 소비자 상담실 (02)561-4011