

MP

500mL



진해거담제

메피롤-씨[®] 시럽

(L-카르보시스테인)

5%

500mL

일반의약품

분류번호 : 222

■ 원료약품 및 그 분량 : 100mL 중

- 유효성분 : L-카르보시스테인(KP) 5g
- 첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP) 0.05g
- 첨가제(타르색소) : 황색 5호
- 기타 첨가제 : 백당, 수산화나트륨, 에데트산나트륨수화물, 에탄올, 염산, 정제수, 혼합과일향 G-1205

■ 성상 : 주황색의 시럽제

■ 효능·효과

- 1) 다음 질환에서의 객담(가래)배출곤란: 급·만성기관지염, 기관지천식, 기관지확장증, 인두염
- 2) 만성부비동염의 배농, 삼출성중이(가운데귀)염의 배액

■ 용법·용량

- 성인 : L-카르보시스테인으로서 초기에 1회 750mg(15mL) 1일 3회 경구투여하고 증상이 나아지면 1회 500mg(10mL) 1일 3회 복용한다.
- 13세 이상~18세 이하 : 이 약으로서 1회 250~500mg(5~10mL)을 1일 3회~4회 복용한다.
- 6세 이상~12세 이하 : 이 약으로서 1회 250mg(5mL)을 1일 3회 복용한다.
- 2세 이상~5세 이하 : 이 약으로서 1회 250~500mg(5~10mL)을 4회 분할 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 위·십이지장궤양 환자
 - 2) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
 - 3) 2세 미만 소아
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 간장애 환자
 - 2) 심장장애 환자
 - 3) 위·십이지장궤양의 병력이 있는 환자
 - 4) 임부 : 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 투여하지 않는 것이 바람직하다. 특히 임신 3개월 이내에는 투여가 권장되지 않는다.
 - 5) 수유부 : 수유부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
 - 6) 고령자 : 일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 신중히 복용할 것.
 - 7) 이 약은 황색 5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

 - 1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 복부(배부분)팽만감, 위장관출혈, 가슴 쓰림, 때때로 식욕부진, 위부불쾌감, 설사, 구갈(목마름) 등 민감한 환자에서 구내염(입안염)
 - 2) 과민증 : 때때로 발진, 홍반(붉은 반점), 습진 등
 - 3) 신경계 : 드물게 두통
 - 4) 호흡기계 : 민감한 환자에서 비염(코염)
 - 5) 기타 : 때때로 가려움, 심계항진(두근거림), 콧물, 전신의 압박감
 - 6) 피부점막만중후군(스티븐스-존슨 증후군), 독성표피괴사증후군(리엘

증후군)

- 7) AST, ALT, ALP, LDH 상승 등을 동반한 간기능장애, 황달
- 8) 쇼크, 아나필락시스모양 반응
- 9) 14일 이상 기침이 계속되는 경우
4. 기타 이 약을 복용시 주의할 사항
 - 1) 과량복용시 위세척이 유익하며, 위장장애가 가장 흔한 증상이다.
 - 2) 항생물질과 트리메토크솔염산염을 함유하는 시럽제와의 혼합에서는 외관(색, 탁함), 냄새 등의 변화가 일어날 수 있으므로 이들 약과의 병용(함께 복용)을 필요로 할 경우에는 따로따로 복용한다.
5. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관할 것.
 - 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관할 것.

■ 포장단위 : 500mL/병

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

■ 제조의뢰자/판매자 : 일성신약(주), 경기도 안산시 단원구 산단로 349

■ 제조자 : 한국콜마(주), 세종특별자치시 전의면 산단길 245

※ 사용기한이 경과한 의약품은 사용하지 마십시오.

※ 기재되어 있지 않은 부작용이 나타날 경우, 의사나 약사 또는 식품 의약품 안전처에 알려십시오.

※ 만약 구입 시 사용기한이 경과되거나 변질·변패·오염되었거나 손상 된 의약품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 사용 설명내용의 최종 개정 연월일(2017.07.11) 이후 변경된 내용은 www.ilsung-ph.co.kr이나 소비자 상담실(수신자 부담) 080-211-0003을 통해 확인할 수 있습니다.

제조번호 :

사용기한 :

ILSUNG 일성신약(주)

www.ilsung-ph.co.kr



HDPE
뚜껑: PP



L MPC R11

(01)08806554003960