

【원료약품 및 그 분량】 100mL 중
 유효성분 : 카르보시스테인(KP) 2,000mg
 첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 80mg
 기타 첨가제 : 소르비톨(70%)(비결정성), 수산화나트륨, 에프리카트렌트, 에데트산나트륨(EDTA-2Na), 정제수, 카리멜루레버, 호소치리시테비아

【성상】
 카리멜 냄새가 나는 적갈색 시럽제
【효능·효과】

1. 다음 질환에서의 객담(가래)배출곤란 : 급·만성기관지염, 기관지천식, 기관지확장증, 인두염

2. 만성부비동염의 배농(고름빼기), 삼출성중이(가운데귀)염의 배액

【용법·용량】

6세 이상~12세 이하 : L-카르보시스테인으로서 1회 250mg 1일 3회 복용한다.

2세 이상~5세 이하 : 이 약으로서 1일 250~500mg을 4회로 분할 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 위·십이지장 궤양 환자 2) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자

3) 2세 미만 소아

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

이 약은 카리멜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 사람은 이약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 간장애 환자 2) 심장애 환자 3) 위·십이지장 궤양의 병력이 있는 환자 4) 임부 : 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 투여하지 않는 것이 바람직하다. 특히 임신 3개월 이내에는 투여가 권장되지 않는다.

일반의약품

소아용

뮤코론[®] 시럽

Mucolon[®] syrup
 (카르보시스테인)

약효분류 : 222 진해거담제

1000mL

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국약물안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr> → 의약품이상사례보고)에 알려도록 하십시오.

※ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의약품 정보 참조

※ 만일, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.

제조·판매



부광약품주식회사

경기도 안산시 단원구 능안로 47

061719

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편의를 위해 부광약품이 통과료를 부담하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다. 제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.
 ♣ 소비자 상담실 : TEL. 080-933-2233 <http://www.bukwang.co.kr>

※ 이 첨부문서 작성일자(2019년 06월 17일)이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

다. 5) 수유부 : 수유부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다. 6) 고령자 : 일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 신중히 복용할 것.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담이 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 복부(배부)팽만감, 위장관출혈, 가슴쓰림, 때때로 식욕부진, 위부불쾌감, 설사, 구갈(목마름) 등. 민감한 환자에서 구내염(입안염) 2) 과민반응 : 때때로 발진, 홍반(붉은반점), 습진 등 3) 신경계 : 드물게 두통 4) 호흡기계 : 민감한 환자에서 비염(코염) 5) 기타 : 때때로 가려움, 심계항진(두근거림), 쿨로, 전신의 압박감 6) 피부점막만종후군(스티븐스-존슨 증후군), 독성표피괴사증후군(리얼증후군) 7) AST, ALT, ALP, LDH 상승 등을 동반한 장기농양, 황달 8) 쇼크, 아나필락시스모양 반응 9) 14일 이상 기침이 계속되는 경우

5. 기타 이 약을 복용시 주의할 사항

1) 과량 복용시 위세척이 유익하며, 위장장애가 가장 흔한 증상이다. 2) 항생물질과 테트라메틸놀염산염을 함유하는 시럽제와의 혼합에 서는 의관(색, 탁함), 냄새 등의 변화가 일어날 수 있으므로 이들 약과의 병용(함께 복용)을 필요로 할 경우에는 따로따로 복용한다.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀봉(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관할 것. 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오염(잘못 사용에 의한 사고 발생)이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관

【포장단위】 1000밀리리터/병

제조번호 :

사용기한 :



(01) 08806422012254