

# 프로부틴정

(트리메부틴말레산염)

일반의약품 | 조제용  
기타의 소화기관용약

※ 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.

## [조성·성상]

1. 원료약품 및 그 분량 : 1정 중  
트리메부틴말레산염(KP) ..... 100.0mg  
첨가제(동물유래) 유당수화물/소/유(乳)  
2. 성상 : 흰색의 원형정제

## [효능·효과]

1. 주요효능 효과  
1) 식도역류 및 열공헤르니아(특새 탈장), 위 십이지장염, 위 십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상 (복통, 소화불량, 구역, 구토)  
2) 과민성대장증후군 및 경련성 결장  
3) 소아 질환 : 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애 (변비, 설사), 동요자극 (안절부절), 수면장애

## [용법·용량]

성인 : 트리메부틴말레산염으로서 1회 100~200mg 1일 3회 식전에 경구투여 (복용)한다.  
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

## [사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.  
이약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.  
2. 이상반응  
1) 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복명(창자 가스소리), 구역, 구토, 소화장애, 구갈(목마름증), 구내마비감 등이 나타날 수 있다.  
2) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다.  
3) 정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기(어지러움), 권태감, 두통 등이 나타날 수 있다.  
4) 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있다.  
5) 과민증 : 드물게 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.  
3. 임부에 대한 투여  
임신 중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.  
4. 수유부에 대한 투여  
수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 투여를 피하고 복부에 투여 시는 수유를 중지한다.  
5. 보관 및 취급상의 주의사항  
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.  
2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.  
3) 오·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 30정/병, 500정/병

[제조사] 한국콜마(주) / 세종특별자치시 전의면 산단길 245

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

- ※ 본 제품은 "우수의약품 제조 및 품질관리기준(GMP)"에 따라 제조 및 품질 검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.  
※ 이 첨부문서 작성일자(2016.12.05)이후로 변경된 내용 및 기타 자세한 의약품 정보는 경보제약 홈페이지(<http://www.kbpharma.co.kr>)나 온라인 의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.  
※ 의약품 부작용 피해구제는 홈페이지(<http://karp.drugsafe.or.kr>) 또는 전화 (02-1644-6223)로 문의할 수 있습니다.

101 · 030117  
(최종 개정연월일 2016년12월05일)

제조회사 :  경보제약

본사 · 공장 : 충청남도 아산시 신푼로 174  
서울 사무소 : 서울특별시 서대문구 충정로 8  
소비자상담실 : 02) 365-2312