

코디케어 2.5% 로션

(히드로코르티손)

일반 의약품
분류번호 264

안전한 피부질환 치료제

CORDICARE 2.5% Lotion

■ 원료약품 및 분량 : 1g 중
히드로코르티손(USP)-----25mg
첨가제(보존제): 벤질알코올(KP)-----1mg

■ 성 상

흰색의 로션제

■ 효능 · 효과

습진 · 피부염, 피부가려움, 벌레물림제

■ 용법 · 용량

사용전 잘 흔들어 섞은 후 1일 1~3회 적당량을 환부(질환부위)에 바르고 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 세균(결핵, 매독 등) · 진균(곰팡이) · 칸디다증, 백선 등) · 바이러스(대상포진, 단순포진, 수두, 풍두증 등) · 동물(곰, 사슴, 말벌 등)성 피부감염증 환자(증상이 악화될 수 있습니다.)
- 2) 이 약 또는 이 약 성분에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
- 3) 고막 천공이 있는 습진성 외이도염 환자(천공부위의 치유지연이 나타날 수 있습니다.)
- 4) 궤양(베제트병 제외), 제2도 심재성(드러나지 않는) 이상의 화상 · 동상 환자(피부재생이 억제되어 치유가 지연될 수 있습니다.)
- 5) 입주위피부염, 보통 여드름, 주사 환자, 비염증성 가려움 환자

2. 다음 환자에는 신중히 사용하십시오.

- 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
- 2) 유 · 소아(특히, 2세 미만 유아의 경우 의사와 상담 하십시오.)
- 3) 고령자(노인)
- 4) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

3. 이상반응

1) 피부

- ① 감염증 : 피부의 세균성(전염성 농가진, 모낭염 등) 및 진균성(칸디다증, 백선 등) 감염증이 나타날 수 있습니다.[밀봉 봉대법(ODT)의 경우 및 따뜻하고 습한 상태의 접힌 피부의 경우 나타나기 쉽습니다]. 이와 같은 증상이 나타날 경우에는 적절한 항균제나 항진균제 등을 병용하고 증상이 신속히 개선되지 않을 경우에는 사용을 중지합니다.
 - ② 일반적 피부증상 : 모낭염, 부스럼, 피부자극, 자통(찌들듯한 아픔), 발열, 적열강(화끈함), 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 홍조(붉어짐), 가려움, 피부건조, 농포성피부염, 알레르기성 접촉피부염, 락피, 한진(따뜻), 상처악화, 욕창, 농포증 등이 나타날 수 있으며, 이러한 증상이 나타날 경우에는 사용을 중지합니다. 두드러기, 피부박탈, 색소침착 변화, 적응부위 자극/통증, 본 증상의 악화가 매우 드물게(<1/10,000) 보고되었습니다.
 - ③ 장기 연용 : 스테로이드성 여드름, 스테로이드성 피부(피부위축, 모세혈관확장, 자반(자주색 반점)), 스테로이드성 주사, 입주위피부염(입주위 · 안면전체에 홍반, 구진, 모세혈관확장, 딱지, 인설(비늘)), 어린선(漁鱗癬)양 피부변화, 다모, 색소탈실, 선조(禿瘡), 수포성피부염, 아토피피부염, 피부출혈 등이 나타날 수 있습니다. 이러한 증상이 나타날 경우에는 천천히 사용량을 줄여 코르티코이드를 함유하지 않은 약으로 바꾸어 사용합니다.
- 2) 면역계 : 국소 과민증이 매우 드물게(<1/10,000) 보고되었습니다.
- 3) 내분비계 : 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용, 밀봉봉대법에 의해 코르티코이드 전신 투여와 같은 뇌하수체 · 부신 피질계 기능의 억제를 가져올 수 있으므로 주의합니다. 시상하부-뇌하수체-부신(HPA) 축의 억제[체중 증가/비만, 소아에게 있어 체중 증가 억제/성장 지체, 쿠싱신드롬 증상(얼굴부종, 복부비만), 내인성 코르티솔 수치 감소, 고혈당증/당뇨, 고혈압, 골다공증, 백내장, 녹내장, 스테로이드 금단현상]가 매우 드물게(<1/10,000) 보고되었습니다.
- 4) 눈 : 안검피부에 사용시 안압 상승, 녹내장을 일으킬 수 있으므로 주의합니다. 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용, 특히 밀봉봉대법을 사용할 경우 후낭하백내장, 녹내장 등이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적주의

- 1) 피부 감염을 수반하는 습진 · 피부염에는 사용하지 않는 것을 원칙으로 하지만 부득이하게 이 약을 사용하는 경우에는 먼저 적절한 항균제(전신적용), 항진균제로 치료하거나 이들과의 병용(함께사용)을 고려합니다. 감염부위가 확산되면 국소 코르티코스테로이드 요법을 중단하고 적절한 항균요법을 실시합니다.
- 2) 국소 코르티코이드의 전신적 흡수 증가는 몇몇 환자에서 당질코르티코스테로이드 결핍의 원인이 되는 가역적인 시상하부-뇌하수체-부신(HPA) 축의 억제, 고코르티솔혈증의 징후(쿠싱증후군, 과혈당증), 당뇨 등을 일으킬 수 있으므로 국소 코르티코이드를 광범위한 체표면 또는 밀봉봉대법 하에 사용하는 환자는 정기적으로 혈중 코르티솔 농도, 요중에 유리되는 코르티솔을 측정하거나 ACTH 자극시험을 하여 HPA축 억제를 검사합니다.
- 3) 국소 코르티코이드의 전신적 흡수 증가로 인해 HPA축이 억제되어 위 증상이 발견된 경우 투여 빈도를 줄이거나, 환절이 약한 코르티코스테로이드로 대체함으로써 이 약물을 서서히 중단합니다. 약물의 갑작스런 중단은 당질코르티코스테로이드 결핍의 이상반응을 일으킬 수 있습니다. 일반적으로 국소 코르티코이드 약물투여 중지 후 HPA축 기능은 신속히 회복됩니다.

- 4) 증상이 개선되지 않거나 악화되는 경우에는 사용을 중지합니다.
- 5) 증상이 개선되면 가능한 한 빠른 시일 내에 사용을 중지합니다.
- 6) 이 약의 치료기간은 7일 이내로 제한합니다.
- 7) 운전이나 기계조작 능력에 이 약이 미치는 효과는 연구된 바없으나 이 약의 약리작용으로부터 이러한 능력의 손상이 예측되지는 않습니다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 생식능력
사람에서의 생식능력에 대한 국소 히드로코르티손의 영향을 평가한 자료는 없습니다.
- 2) 임부
① 동물실험에서 비교적 적은 용량의 코르티코이드를 전신적으로 투여한 경우, 좀 더 강력한 코르티코이드 피부부도로 인해 기형 발생이 나타났습니다.
② 임부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 모체에 대한 치료상의 유익성이 태아에 대한 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 이 약을 투여합니다. 이 경우 최소의 기간 동안 최소용량만 투여하여야 합니다.
- 3) 수유부
① 이 약이 모유로 이행한다는 보고는 없으나 전신적으로 흡수된 코르티코이드가 모유 중으로 이행되므로 수유부에 투여 시 주의합니다.
② 수유부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 수유부에 대한 치료상의 유익성이 영아에 대한 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.
③ 수유 중 이 약을 사용하는 경우, 영아(젖먹이, 갓난아기)가 사고로 섭취하는 것을 피하기 위해 가슴부위에 사용하지 않습니다.

6. 소아에 대한 투여

- 1) 12살 미만의 유 · 소아에게는 부신 억제제가 더 많이 일어날 수 있으므로 장기간 연속적인 국소 요법은 가능한 한 피합니다.
- 2) 소아는 체중당 체표면적의 비율이 성인보다 크고, 피부장벽이 미성숙하여 성인에 비해 비례적으로 더 많은 양이 흡수되어 HPA축 억제, 쿠싱증후군, 발육장애 등이 나타나기 쉬우므로 주의합니다.
- 3) 기저귀 등은 밀봉봉대법과 같은 작용을 나타낼 수 있으므로 주의합니다.

7. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 부작용이 나타나기 쉬우므로 대량, 장기간, 광범위하게(특히 밀봉봉대법) 사용할 경우 충분히 관찰하는 등 주의합니다.

8. 과량 투여시의 처리

국소적으로 투여된 히드로코르티손이 많은 양 흡수 되어 전신효과를 일으킬 수 있습니다. 급성 과량 투여는 거의 발생하지 않으나, 만성 과량투여 또는 오용의 경우, 고코르티솔혈증의 증상이 나타날 수 있습니다. 임상적 지시에 따라 추가적으로 관리합니다.

9. 적응상의 주의

- 1) 안과용으로 사용하지 않습니다.
- 2) 화상이나 연도 후 등 치료 이외의 목적으로 사용하지 않습니다.
- 3) 의사의 감독없이 밀봉봉대법을 사용하지 않습니다(특히 밀봉봉대법을 사용할 경우 세균감염이 나타나기 쉬우므로 적용 전에 환부를 청결히 합니다).
- 4) 얼굴은 위축성 변화에 더욱 민감하므로 장기 투여하지 않습니다.

10. 저장상의 주의사항

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

11. 기타

건선(마른비늘증)환자에 장기간, 대량 사용한 경우 치료 중 또는 치료종지 후 건선성홍피증(홍색피부증), 농포(고름집)/성건선 등이 나타났다는 보고가 있습니다.

■ 저장방법 : 기밀용기, 15~30℃보관

■ 사용기간 : 제조일로부터 24개월

■ 포장단위 : 50g/병, 100g/병

■ 제조원 : (주)동구바이오제약, 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 18

- * 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.
- * 사용(유효)기한이 지난 의약품을 사용하지 마십시오.
- * 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁해결기준에 따라 교환 · 환불 받을 수 있습니다.
- * 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

이 첨부서류의 작성일(2017년 05월 08일)이후 변경된 내용은 식품의약품 안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)나 당사 소비자상담실 080-611-8690(수신자부담)로 문의하시어 확인할 수 있습니다.