

종합비타민제

액티나민플러스정

Actinamine Plus Tab.

【원료약품의 분량】1정 중

아스코르브산(KP)	600mg
판토텐산칼슘(KP)	20mg
푸마르산철(KP)	13.5mg
(철로서 4.4mg)	
푸르실티아민염산염(KP)	27,285mg
(푸르실티아민으로서 25mg)	
피리독신염산염(KP)	5mg
셀레늄함유건조효모(KP)	46.3mg
(셀레늄으로서 25μg)	
신화이엔(KP)	9.33mg
(아민으로 7.5mg)	
d-비오틴(USP)	22.5μg
시아노코발라민1000배산(KP)	6,000μg
(시아노코발라민으로서 6μg)	
폴산(USP)	250μg
니코틴산아미드(KP)	50mg
리보플라빈부티레이트(KP)	5mg
토코페롤아세테이트2배산(KP)	40mg
(토코페롤아세테이트로서 20μg)	
첨가제(동물유래) : 유당수화물 (7가원동물 : 소, 사용부위 : 우유)	
첨가제(타르색소) : 황색 203호, 황색 5호	

【성 상】이 약은 노란색의 타원형 필름코팅정이다.

【효능·효과】

○ 다음경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, C, E의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하
- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 각기, 눈의 피로
 - 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화, 잇몸출혈, 비출혈(코피) 예방

○ 아연의 보급

【용법·용량】

만 8세 이상 어린이 및 성인 : 1회 2정을 1일 1회 복용 또는 1회 1정씩 1일 2회 복용

【사용상의 주의사항】

1) 경고

철 함유제제는 만 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것

2) 다음 환자에는 투여하지 말 것

이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3) 다음 환자에는 신중히 투여할 것

이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - (2) 만 12개월 미만의 영아
 - (3) 혈액색소(철대사 이상으로 철이 간장, 췌장(이차)에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈
- 5) 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
- (1) 안산염, 칼슘염, 강구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - (2) 레보도파

6) 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - (2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - (3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - (4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자(철분 또는 셀레늄 함유제제)
 - (5) 심장·순환기계기능 장애 환자(미네랄 함유제제)
 - (6) 신장장애 환자(미네랄 함유제제)
 - (7) 저단백혈증 환자(미네랄 함유제제)
 - (8) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
- 7) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것
- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은 변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부팽만감, 두드러기, 가려움, 광선과민반응, 복부·위통증, 경련, 열, 혼수, 피부염, 땀·호흡기 약취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 배부증
 - (2) 이 약의 투여에 의하여 생리주기가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
 - (3) 예발도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
 - (4) 증가될 수 있다.
 - (5) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
 - (6) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - (7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고옥살산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
 - (8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부정(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - (9) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
 - (10) 1개월 정도 과량복용 한 경우
 - (11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

8) 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
 - (2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
 - (3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피할 것
- 9) 저장상의 주의사항
- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
 - (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【포장단위】60정/병, 120정(10정/PTP포장*12)

【저장방법 및 사용기간】기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 24개월

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실(☎031-377-7309)로 문의하시기 바랍니다.

* 이 첨부문서 개정일자 이후 변경된 내용은 한국휴텍스제약(주) 홈페이지(www.huteks.co.kr)에서 확인해주시십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.



한국휴텍스제약(주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99

설명서 작성일 : 170202



우수약품제조관리기준