



8806963004107

일반의약품

분류번호 : 316 (혼합비타민제, 비타민 A, D 혼합제제를 제외)
본 의약품 사용 전에 제품 설명서를 잘 읽어보시고, 의약품과 함께 보관하세요.

엑티넘[®] EX GOLD

이엑스골드정


눈의 피로, 어깨 결림, 목 결림, 요통, 오십견,
근육통, 신경통, 관절통, 손발저림

· 엑티넘이엑스골드정은 비타민 B₁, 비타민 B₆, 비타민 B₁₂ 등이 함유되어, 눈의 피로, 어깨 결림, 목 결림, 오십견, 근육통, 신경통, 관절통, 손발저림 등의 증상완화에 효과적입니다.

· 다케다제약에서 개발한 비타민 B₁유도체인 푸르셀티아민은 생체 이용율을 높인^{1,2} 활성 비타민*입니다. 또한 활성형 비타민 B₆³인 피리독살포스페이트수화물, 활성형 비타민 B₁₂⁴인 메코발라민 뿐 아니라 비타민 E 인 α - α -토코페롤숙시네이트, 비타민 B₉인 폴산 (엽산)과 감마오리자놀이 함유되어 있습니다.

· 다케다제약에서 60년 노하우로 개발된 특허받은
비타민으로 복용하기 쉬운 노란색의 소형 당의정입니다.

www.actinum.co.kr



원료약품 및 분량

유효성분	1정 중	3정 중
푸르셀티아민염산염(JP) (푸르셀티아민으로서)	36.39mg (33.33mg)	109.16mg (100mg)
피리독살포스페이트수화물(JP)	20.0mg	60.0mg
메코발라민(JP)	500.0 μ g	1500.0 μ g
α - α -토코페롤숙시네이트(별규)	33.33mg	100.0mg
γ -오리자놀(별규)	3.33mg	10.0mg
폴산(JP)	0.33mg	1.0mg

· 기타 첨가제: 경질무수구산, 구산칼슘, 글리세린모노스테아레이트, 리보플라빈, 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 수크로오스, 스테아르산마그네슘, 아라비아고무가루, 에리스리톨, 옥수수전분, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 정제젤라틴, 침강탄산칼슘, 카르나우바납, 탈크, 피마자유, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스

효능효과

다음 증상의 완화: 눈의 피로, 근육통 · 관절통(어깨 · 목 결림, 요통, 오십견 등), 신경통, 손발의 저림

용법용량

15세 이상 소아 및 성인: 1일 3회, 1회 1정을 식후 즉시 씹지 말고 복용할 것

성상 노란색의 원형 당의정

포장단위 90정/병

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃), 차광하여 보관

사용 기한

외부 포장 참조

사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 15세 미만의 소아
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
 - 레보도파
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
 - 약물 등에 과민반응을 일으킨 적이 있는 사람
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 다음과 같은 경우, 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것
 - 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 피부 : 발진 · 발적, 가려움
 - 소화기계 : 구역 · 구토, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부 팽만감, 위부 불편감, 복통
 - 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 지속 또는 심해지는 경우
 - 연변(무른 대변), 설사, 변비
 - 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
 - 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
 - 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μ g 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
 - 우발적으로 과량을 복용한 경우
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 정해진 용법용량을 잘 지킨다.
 - 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관한다.
 - 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.
 - 사용 후에는 마개를 잘 닫아서 보관한다.



제조의뢰자

Takeda Consumer Healthcare Company Limited
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-city, Osaka 541-0045, Japan

제조사

Takeda Healthcare Products Company Limited
2-21, Osadano-cho, Fukuchiyama, Kyoto 620-0853, Japan

수입판매원

한국다케다제약주식회사 : 서울특별시 강남구 테헤란로98길 8, 9층, 12층 (대치동)
제품문의 : 080-553-3300

- 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.
- 본 의약품이 유통과정의 잘못으로 인해 사용기한이 경과되었거나 제품이 변질, 변패, 오염 및 손상된 경우 구입한 약국을 통하여 교환 또는 환불 받으실 수 있습니다.
- 올바른 사용(복용) 법을 모르시거나 의문사항이 있는 경우 의사 · 약사와 상담하세요.
- 본 설명서의 개정일 이후의 최신허가사항은 식품의약품안전처 온라인의약품서관(<http://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 한국다케다제약 홈페이지(www.takeda.co.kr)의 제품정보를 참조하시기 바랍니다.
- 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 알리거나 한국다케다제약 (02-3484-0800)으로 연락 바랍니다.
- Reference
 1. Yoshinori Itokawa *et al.*, Vitamin(Japan), 1992;66(1):35-42
 2. Greb A. *et al.*, Int J Clin Pharmacol Ther.1998;Apr;36(4):216-21
 3. Elisa Oppici *et al.*, Human Molecular Genetics, 2015;24(19):5500-5511
 4. Yoshihiro Sato *et al.*, Journal of the Neurological Sciences, 2005;231:13-18

*활성 비타민 : 생체이용률을 향상시킨 비타민, *활성형 비타민 : 생물활성을 갖는 비타민

※ 개정연월일 : 2019년 02월 27일

A-18-69