1캡슐 일반의약품 | 분류번호 : 319

피로회복제

테라비타 (연질캡슐)

[원료약품 및 분량] 1캡슐 중 콜레칼시페롤농축물(유상형)(EP) 0.4mg(콜레칼시페롤로서 400 I.U), 아스코르브산(KP) 75mg, 티아민염산염(KP) 25mg, 리보플라빈(KP) 4mg, 니코틴산아미드(KP) 20mg / 첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP) 0.084mg, 파라옥시벤조산프로필(KP) 0.021mg / 첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색4호, 적색40호 / 첨가제 (동물유래성분) : 젤라틴(소, 가죽)

[효능·효과] 1. 다음경우의 비타민 D, B1, B2, C의 보급 1) 육체피로 2) 임신·수유기 3) 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 4) 발육기 5) 노년기 **2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.** 1) 뼈, 이의 발육 불량 2) 구루병의 예방 3) 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등) 4) 각기 5) 눈의 피로

[용법·용량] 성인 1회 1캡슐, 1일 1회 복용

[판매자] **보령제약**

OTHER

제조번호 : 1601 | 사용기한 : 2019. 12. 20.

[성 상] 황갈색의 내용물이 든 암갈색의 장방형 연질캡슐제

[사용상의 주의사항] 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것 1) 고칼슘[illegible] calciuria : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarc[illegible] 수 있는 전신 염증질환), 신장질환 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 [illegible] 환자 3) 만 3개월 미만의 젖먹이 4) 신장결석 환자 5) [illegible] 있는 환자 6) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자 2. 다음[illegible] 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태) 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다. 4) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자 5) 신장결석 병력이 있는 환자 6) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자 7) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. 3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 식욕부진, 복부팽만감 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. 3) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. 4) 우발적으로 과량복용 한 경우 5) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 4. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것 2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다. 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다. 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다. 5. 저장상의 주의 사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[저장방법] 차광밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[제조자] **(주)레고켐제약**

경기도 안성시 원곡면 원당로 354
소비자상담실 : 031-692-2900

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환해 드립니다. ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다. ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약도서관(http://drug.mfds.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.
※ 작성일 : 2018. 12. 26. (Rev. 0)