

건위소화제

베아타제정

Beartase Tab.

【원료약품의 분량】1정 중

디아스타제 · 프로테아제 (KP).....	20mg
(α -아밀라제 2,000, β -아밀라제 240단위, 프로테아제 640단위)	
탄산수소나트륨 (KP)	250mg
메타규산알루미늄산마그네슘 (KP)	100mg
첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)	
첨가제(타르색소) : 청색 1호 알루미늄레이크, 황색 203호 알루미늄레이크, 황색 5호 알루미늄레이크	

【성 상】연두색 장방형의 필름코팅정

【효능·효과】

위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 체할, 구역, 구토, 위통, 신트림, 소화불량, 식욕감퇴(식욕 부진), 과식, 체할 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

【용법·용량】

성인 1회 1~2정 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 투석요법을 받고 있는 환자
 - 만 7세 이하의 어린이
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(glactose intolerance), Lapp유당분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 테트라사이클린계 항생제
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
 - 신장장애 환자
 - 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
 - 다른 약물을 복용하고 있는 사람
 - 인산염 저하가 있는 사람
- 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 경우
 - 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 가타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 나트륨 제한 식이를 하는 사람
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
 - 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】500정(10정/PTP×10)×5)

【저장방법 및 사용기간】기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실(☎.031-377-7909)로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 이 첨부문서 개정일자 이후 변경된 내용은 한국휴텍스제약(주) 홈페이지(www.hutechs.co.kr)에서 확인해주십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.


한국휴텍스제약(주)
 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99


설명서 작성일 : 170103