

암로 델미 정 40/5mg, 40/10mg, 80/5mg (텔미사르탄 파우더(23.9%),암로디핀베실산염)

【성분·함량】 1정 중

- 40/5mg：텔미사르탄파우더(23.9%)(텔미사르탄으로서 40mg)(별구) ----- 167.36mg
암로디핀베실산염(암로디핀으로서 5mg)(EP) ----- 6.935mg
- 40/10mg：텔미사르탄파우더(23.9%)(텔미사르탄으로서 40mg)(별구) ----- 167.36mg
암로디핀베실산염(암로디핀으로서 10mg)(EP) ----- 13.87mg
- 80/5mg：텔미사르탄파우더(23.9%)(텔미사르탄으로서 80mg)(별구) ----- 334.72mg
암로디핀베실산염(암로디핀으로서 5mg)(EP) ----- 6.935mg
- 첨가제(타르색소)：청색 1호 알루미늄레이크
- 기타 첨가제：미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 전호화전분, 폴로이드성아산화규소, 푸마르산소테아릴나트륨, 흑색산화철, D-만니톨

【특 성】 현색과 연한 회색의 양면이 불룩한 타원형 이중정이다.

【효능·효과】

텔미사르탄 또는 암로디핀 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압

【용법·용량】

이 약의 권장용량은 1일 1회 1정으로, 식사와 관계없이 물과 함께 복용한다. 가능한하면 매일 같은 시간(예：아침)에 복용하는 것이 권장된다.

- 이 약을 투여하기 전에 개개의 성분(텔미사르탄 또는 암로디핀)으로 용량을 조절할 것이 권장되나, 다음과 같이 2개의 성분에 대한 혈압이 조절되지 않는 경우 이 약으로 바로 시작할 수 있다. 고려할 수 있다.
 - 40/5밀리그램：암로디핀 5밀리그램 또는 텔미사르탄 40밀리그램으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 환자에게 투여한다.
 - 80/5밀리그램：암로디핀 5밀리그램 또는 이 약 40/5밀리그램으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 환자에게 투여한다.
 - 40/10밀리그램：암로디핀 10밀리그램으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 환자에게 투여한다.
- 텔미사르탄과 암로디핀을 병용으로 복용하고 있는 환자인 경우, 복용의 편리함을 위하여 이 약(2개의 주성분 함량이 동일한 복합제)으로 전환할 수 있다. (이 약 40/5밀리그램에 한함).
- 신장에 환자：경증 및 중등도 신장애 환자인 경우 용량조정이 필요치 않으나, 중증의 신장애 환자인 경우 낮은 용량으로 치료를 시작하는 것이 권장되며, 용량을 서서히 증량한다. 또한 혈청 칼륨 및 크레아티닌 수치에 대한 주기적인 모니터링이 권장된다.
- 간장애 환자：경증 또는 중등증의 간장애 환자에 대한 텔미사르탄의 1일 투여량은 40밀리그램을 초과하지 않아야 한다.
- 고령자：일반적인 암로디핀 용임이 고령자에게 권장되지만, 용량 증량 시 주의하여야 한다.(3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것 함 참조) 75세 이상의 고령자인 경우, 암로디핀의 청소율이 감소되어 있으므로, 낮은 용량으로 치료를 시작하여, 용량을 서서히 증량한다.
- 소아：만 18세 이하의 소아환자에 대한 안전성·유효성이 확립되어 있지 않아 이 약의 투여가 권장되지 않는다.

【사용상의 주의사항】

- 경고
 - 이 약과 같이 레닌-안지오텐신계에 직접적으로 작용하는 약물을 일부에 투여하는 경우 저리나는 태아 또는 신생아에게 병적 상태 및 사망을 일으킬 수 있다. 특히 임신 27 3개월 및 37 3개월 중의 이러한 약물의 사용은 저혈압, 신생아 두개골 형성 저하증, 무호흡, 기격적 또는 비가역적인 신부전 및 사망을 포함한 태아 또는 신생아의 손상과 관련성이 있다. 태아의 신기능의 저하가 원인일 것으로 추정되는 양수과소증이나 보고된 바 있으며, 양수과소증은 태아의 사지연축, 두개안면기형, 혈청 효소 저하증과 관련성이 있다. 매측, 자궁내 성장 지연, 동맥관폐색증이 보고된 바 있으나, 이 약 노출에 의한 것인지 여부는 명확하지 않다. 임신이 진단된 경우에는 가능한 빨리 이 약의 투여를 중단해야 한다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 이 약의 주성분 또는 다이드로피리딘계 유도체에 과민증이 있는 환자
- 임부임산 27기 및 37기) 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
 - 수유부
 - 중증의 간장애 환자
- 담도폐쇄성 질환자
- 최심상 우측로 폐색 (예: 높은 등급(high grade)의 대동맥협착)
- 중증의 저혈압 환자
 - 속 환자(심정성 쇼크 포함)
- 급성 심근경색 이후 혈역역학적으로 불안정한 심부전 환자
- 이 약의 치료에 대해 불내성 등의 유전적인 문제가 있는 환자
- 당뇨병이나 중등도~중증의 신장애 환자(사구체여과율 (80mL/min/1.73m²)에서 알리스키렌 함유제제와의 병용

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 원발성 알도스테론증 환자：원발성 알도스테론증 환자의 경우, 일반적으로 레닌-안지오텐신계를 저해하는 혈압강화제는 효과가 없으므로 이 약의 사용은 권장되지 않는다.
- 동맥관 폐쇄성 심근병증 환자나 폐쇄성 비후성 심근병증 환자：다른 혈관이완제와 마찬가지로 동맥관 또는 심근관협착증 환자나 폐쇄성 비후성 심근병증 환자의 경우, 특히 주의해야 한다.
- 간장애 환자：암로디핀은 간에서 광범위하게 대사되며 텔미사르탄은 거의 대부분 담즙으로 배설된다. 따라서 담즙 정체, 담도폐쇄성 질환이 있는 환자나 간장애 환자의 경우 간 청소를 감소로 예상할 수 있다. 간기능 장애 환자에서 암로디핀의 반감기가 연장되며 AUC 수치가 더 높게 나타났다(경증 용량에 아직 확립되지 않음). 따라서 경증 또는 중등증의 신장애 환자에는 주의하여 투여해야 하며, 1일 1회 텔미사르탄 40밀리그램을 초과하지 않아야 한다.
- 활동성 위 또는 신장지체양 등 위장관계 질환 환자：텔미사르탄 투여시 위장관계 이상반응이 위약 투여시보다 더 자주 나타났다. 위장관 출혈이 임상시험에서 드물게 관찰된 바 있으나 대부분 위장관 질환을 가진 환자에서 초기에 나타났다. 따라서 위장관계 질환자에게 이 약을 투여할 때는 주의하여야 한다.
- 신혈관 고혈압 환자：좌우 양쪽의 신동맥협착증이나 한쪽 신장만 기능하는 경우의 신동맥협착증이 있는 환자를 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 영향을 미치는 약물로 치료할 경우에는 중증의 저혈압이나 신부전의 위험이 증가된다. 양쪽 또는 한쪽의 신동맥협착증이 있는 환자에게는 이 약을 투여할 경우 안지오텐신 전환효소(ACE) 저해제와 마찬가지로 혈청 크레아티닌 또는 혈중 요산수치의 상승이 예측된다.
- 투석을 해야하는 신부전환자
- 고령자：고령 환자에서의 암로디핀의 용량을 증감할 경우에는 주의하여야 한다(‘용법·용량’항 참조).
- 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)의 이중차：안지오텐신 수용체 차단제(ARB), ACE억제제, 또는 알리스키렌 등 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)에 영향을 미치는 다른 약제와의 병용은 권장되지 않는다.

4. 이상반응

- 안전성 프로파일 요약
- 가장 흔하게 보고된 이상반응은 어지러움 및 말초부종이며, 중대한 이상반응은 실신은 드물게 보고될 수 있다(1,000명 환자 당 1건 이하).
- 이 약에 대한 안전성 및 내약성은 3,600명 이상의 환자가 참여한 다섯 개의 비교 임상을 통해 평가되었으며, 이 중 2,900명이 넘는 환자가 텔미사르탄과 암로디핀을 병용되어 받았다. 임상시험에서 텔미사르탄과 암로디핀의 병용투여 시 단일의 이상반응과 비교하였을 때 추가적인 이상반응이 확인되지 않았다. 암로디핀 단일제에 대한 용량 의존적 이상반응으로 알려진 말초부종은 암로디핀만 복용한 환자들에서보다 암로디핀/텔미사르탄 투여군에서 전반적으로 더 낮은 발생율로 관찰되었다.
- 비록 임상시험 또는 시판 후 기간 동안에 관찰되지 않았을지라도, 단일제(텔미사르탄 또는 암로디핀)에서 과거에 보고된 이상반응은 이 약에서도 잠재적인 이상반응일 수 있다. 추가적인 안전성 정보는 텔미사르탄 또는 암로디핀 단일제 허가사항을 참조한다.
- 이상반응 요약
- 텔미사르탄/암로디핀 복합제 또는 단일제(텔미사르탄 또는 암로디핀)의 임상시험 또는 시판 후 경험에서 보고된 이상반응을 MedDRA에 따라 분류하여 아래 표로 나타내었다.
- 발현빈도는 다음과 같이 정의되었다. 매우 흔하게 (≥1/10), 흔하게 (≥1/100, (1/10), 흔하지 않게 (≥1/1,000, (1/100), 드물게 (≥ 1/10,000, (1/1,000), 매우 드물게 (≤1/10,000), 덜 수 없음(사용 가능한 자료로부터 추정할 수 없음).

기관계명	발현 빈도	이상반응	
감염 및 기생충 감염	흔하지 않게	텔미사르탄	암로디핀
		상기도감염(인두염 및 부비동염 포함), 오로감염(방광염 포함)	
	드물게	방광염	패혈증(자명적 결과 포함)
	흔하지 않게	빈혈	
혈액 및 림프계 장애	드물게	혈소판감소증, 호산구증가증	
	매우 드물게		백혈구감소증, 혈소판감소증

면역계 장애	드물게	과민성, 아나필락시스반응	
			과민성
대사 및 영양 장애	매우 드물게		
	흔하지 않게	고칼혈총증	
	드물게	저혈당증(당뇨 환자에서)	
	매우 드물게		고혈당증
정신 장애	흔하지 않게	우울증, 불면증	기분변화, 우울증, 불안, 불면증
	드물게	우울증, 불안, 불면증	혼돈상태
신경계 장애	흔하게	어지러움	어지러움, 졸림, 두통
	흔하지 않게	졸림, 편두통, 두통, 감각이상	실신, 감각이상, 감각저하, 미각이상, 떨림
	드물게	실신, 말초신경병증, 감각저하, 미각이상, 떨림	
			추체외로장애, 근육긴장 현전증, 말초신경병증
시각 장애	매우 드물게		
	흔하게		시각장애(복시 포함)
	흔하지 않게		시각장애
	드물게		시각장애
귀 및 미로 장애	흔하지 않게	현기증	현기증
	흔하게		이명
심장 장애	흔하지 않게	서맥, 두근거림	서맥
	드물게		빈맥
	매우 드물게		심근경색, 심실성빈맥, 부정맥, 심방세동
	흔하게		홍조
심혈관계 장애	흔하지 않게	저혈압, 기립성저혈압, 홍조	저혈압
	매우 드물게		혈관염
	흔하지 않게	기침	호흡곤란, 비염, 기침
	매우 드물게	간질성폐질환 ¹⁾	
위장관계 장애	흔하게	배변습관변화(설사 및 변비 포함), 복통, 소화불량, 구역	
	흔하지 않게	복통, 설사, 구역	위장차내공기감, 복통, 설사, 구역, 소화불량
	드물게	구역, 잇몸비대, 소화불량, 구강건조	복부불쾌감, 구강건조
	매우 드물게		해장염, 위염, 잇몸비대
간담도 장애	드물게		간기능이상, 간장애 ²⁾
	매우 드물게		간염, 황달, 간효소증가 (대부분 담즙정체와 함께 나타남)
피부 및 피하조직 장애	흔하지 않게	가려움증	다한증, 발진, 가려움증
	드물게	습진, 홍반, 발진	혈관부종(치명적 결과 수반), 독성피부발진, 약물발진, 두드러기, 습진, 홍반
	매우 드물게		혈관부종, 다형성홍반, 두드러기, 발발피부염, 스티븐스-존슨증후군, 광과민반응
	알 수 없음		독성표피괴사증후군
근골격 및 결합조직 장애	흔하게		관절통증, 근육경련
	흔하지 않게	관절통, 근육경련 (다리 경련), 근육통	요통, 근육경련, 근육통
	드물게	요통, 사지통증(다리통증)	힘줄통증(건염과 같은 증상들), 관절통, 사지통증
	흔하지 않게		신기능장애 (급성신부전 포함)
신장 및 요로 장애	드물게	아간뇨	배뇨질환, 빈뇨증, 야간뇨
	흔하지 않게	발기기능장애	남성의 여성형유방, 발기기능장애
생식계 및 유양 장애	매우 흔하게		부종
	흔하게	말초부종	무력증, 피로
전신 장애 및 투여 부위 장애	흔하지 않게	무력증, 흉통, 피로, 부종	통증, 흉통, 병감(견뎌)
	드물게	병감(견뎌)	혈액류역저하사실증
임상 검사	흔하지 않게	간효소증가	혈액크레아티닌증가
	드물게	혈액요소증가	혈액크레아티닌증가

¹⁾ 텔미사르탄의 시판 후 경험에서 간질성폐질환(주로 간질성폐렴 및 호산구성폐렴)이 보고되었다.

²⁾ 텔미사르탄의 간기능이상 및 간장애 시판 후 이상반응은 이러한 이상반응이 발현될 것으로 예상되는 일반 환자에서 대부분 발생하였다.

국내 시판 후 조사 결과

국내에서 재사용을 위하여 6년 동안 610명을 대상으로 실시한 시판 후 조사 결과, 이상사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 3.28%(20/610명, 총 20건)으로 보고되었다. 이 중 중대한 이상사례의 발현율은 0.48%(3/610명, 총 3건)로 간세포염증, 신경성, 율혈성심부전 각 0.16%(1/610명, 1건)로 보고되었다. 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응은 0.16%(1/610명,

총 1건)로 율혈성심부전 0.16%(1/610명, 1건)가 보고되었다.

예상하지 못한 이상사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 1.31%(8/610명, 총 8건)로 보고되었으며, 간세포염증, 근육격증, 통증, 신경성, 독동증, 상복부불쾌감, 상복부 통증, 체위성어지럼증 각 0.16%(1/610명, 1건)로 보고되었다. 이 중, 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응 발현율은 0.33%(2/610명, 총 2건)로 상복부불쾌감, 체위성 어지럼증 각 0.16%(1/610명, 1건)가 보고되었다.

5. 일반적 주의

- 임신：임신 기간 중에 안지오텐신 II 수용체 길항제 투여를 시작해서는 안 된다. 만약 안지오텐신 II 수용체 길항제의 지속적 치료가 필수적이지 않다면, 임신을 계획 중인 환자는 임부의 사용에 대한 안전성 프로파일의 확립된 다른 고혈압 치료제로 대체하여야 한다. 임신이 진단된 경우에는 가능한 빨리 안지오텐신 II 수용체 길항제의 치료를 중단해야 하며, 만약 적절하다면, 다른 치료제로 치료를 시작해야 한다.
- 저혈압：제어이나 염류가 부족한 환자 (예, 고혈압의 이노제로 치료 받고 있는 환자)와 같이 레닌-안지오텐신 시스템이 활성화된 환자들에서는 이 약의 치료를 시작한 후에 중추성 저혈압이 발생할 수 있다. 이러한 상태는 이 약을 투여하기 전에 고혈하거나 전일한 의학적 감독 하에 이 약의 용량을 감소하여 치료를 시작하여야 한다. 저혈압이 발생한 경우 환자를 빈도이 높히고 필요한 심리 상임수를 정맥주사로 적적 주입한다. 일시적인 저혈압 반응은 알로로의 치료에 대한 금기 사항이 아니며, 일반적으로 일단 혈압이 안정화되면 어려움 없이 치료를 지속할 수 있다.
- 고칼혈총증：텔미사르탄의 경우 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 영향을 미치는 다른 약물로 치료종임 때 특히 신장에 환자 및/또는 심부전 환자의 경우, 고칼혈총증이 일어날 수 있다. 위험이 있는 환자에 대해서 혈청 칼륨치의 적절한 모니터링이 권장된다. 레닌-안지오텐신계에 영향을 미치는 다른 약물의 사용경향을 바탕으로, 칼륨저류성 이노제, 칼륨보충제, 칼륨이 함유된 염 대용품을 칼륨치를 감소시킬 수 있는 다른 약제(만년 등)과의 병용에 의해 혈청 칼륨치가 상승할 수 있으므로 이들 약물과 이 약의 병용투여는 신중해야 한다.
- 신장애 환자：텔미사르탄의 경우 민감한 환자들에서는 레닌-안지오텐신-알도스테론 시스템 저해에 대한 결과로서 신기능의 변화가 예상할 수 있다. 신기능이 레닌-안지오텐신-알도스테론 시스템의 활성화에 의존적인 수 있는 환자들에서, 중증의 율혈성 심부전 환자에서는 안지오텐신-전환 효소(angiotensin-converting enzyme, ACE) 저해제 및 안지오텐신 II 수용체 길항제로의 치료가 소변감소증 및/또는 진행성 질소혈증, 그리고 (드물게) 급성 신부전 및/또는 사망과 관련이 있었다. 유사한 결과가 텔미사르탄으로 치료를 받는 환자들에서도 나타났다 수 있다. 신장애 환자에서 이 약을 투여할 때 혈청 칼륨 및 크레아티닌치의 주기적인 모니터링이 권장된다. 최근에 신장애 이사한 환자에 대해서는 이 약의 사용경향이 있다.
- 심근경색의 위험 또는 협심증의 증가：암로디핀의 경우 특히 중증의 폐색성 관상 동맥 질환이 있는 환자들에서 칼슘 채널 차단제 요법을 시작하거나 용량을 증가시킨 시험에서 드물게 협심증 또는 급성 심근 경색의 발생 빈도, 기간 및 중증도가 증가한 기록이 있다. 이러한 영향에 대한 기전은 아직 해명되지 않았다.
- 암로디핀의 경우 혈당증도 반감기가 길어 투여를 중단한 후에도完만한 혈당강하작용이 나타나므로, 투여 중지 후 다른 혈압 강하제를 투여하는 경우에는 용량 및 투여간격에 주의하고, 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여한다.
- 심부전환자에 대한 투여：중증 심부전(NYHA class II 및 IV 등) 환자에 대한 암로디핀의 장기간, 위약대조시험(PRASE-2)에 서 보고된 폐부종 발생율은 위약 군보다 투여 군에서 더 높았다. 따라서 심부전 환자에게는 주의하여 투여하여야 한다. 암로디핀을 포함한 칼슘채널차단제는 항후 심혈관계 사건 및 사망의 위험을 증가시킬 수 있기 때문에 율혈성 심부전 환자에게 주정해서 사용하여야 한다.
- 이 약은 스코비제를 함유하고 있으므로 유전적으로 과당 불내성 환자에게는 적합하지 않다.
- 당뇨：심혈관 질환에 대한 추가적인 위험성이 있는 당뇨환자(예: 당뇨와 관상동맥질환이 동시에 발견된 환자)인 경우, 안지오텐신 II 수용체 길항제 또는 안지오텐신 전환효소 저해제와 같은 혈압강화제 복용시 치명적인 심근경색 및 예상치 못한 심혈관 질환으로 인한 사망 위험성이 증가할 수 있다. 당뇨 환자에서 관상동맥질환에 대한 증상이 나타나지 않아, 이에 대해 진단되지 않을 수 있으므로, 당뇨 환자는 이 약 투여시 관상동맥질환을 발현하고 치료하기 위한 적절한 진단 평가에：운동 부하 검사)를 우선적으로 실시해야 한다.
- 운전 및 기계조작에 대한 영향：이 약이 운전 및 기계조작에 미치는 영향에 대한 연구는 실시되지 않았으나, 혈압강화제를 복용할 때 때때로 졸음, 어지러움이 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 또는 위험이 수반되는 기계의 조작시 주의해야 한다.
- 기타：다른 혈압강화제에서와 같이, 허혈성 심질환이나 허혈성 심혈관 질환이 있는 환자에서 과도한 혈압 강하는 심근경색이나 뇌졸중을 일으킬 수 있다.

6. 상호작용

- 암로디핀 및 텔미사르탄 병용시 유의한 약동학적 상호작용이 나타나지 않았다. 이 약과 다른 약물들의 약물 상호 작용에 대한 연구는 실시되지 않았다.
- 텔미사르탄의 약물 상호 작용
 - 다극성：텔미사르탄과 다극신과 함께 투여했을 때, 다극성의 최고 혈장 농도 중양감 (49%) 및 최저 농도 중양감 (20%) 증가가 관찰되었다. 따라서 텔미사르탄 투여를 시작하거나, 투여량을 조절하거나 투여를 중단할 경우 나타날 수 있는 과도한 또는 과소한 다지혈리소 작용을 피하기 위해 다극성 농도를 모니터링 하는 것이 권장된다.
 - 리튬：리튬과 안지오텐신 전환 효소 저해제를 병용 투여하는 동안 혈청 리튬 농도의 가역적 증가 및 독성이 보고되었다. 텔미사르탄을 포함한 안지오텐신 수용체 길항제에 대해서도 이러한 사례들이 보고되었다. 따라서 리튬과 텔미사르탄을 병용하는 동안에는 혈청 리튬 수치를 모니터링하는 것이 권장된다.
 - 라이피릴 및 라이피릴라트：한 임상 시험에서 텔미사르탄과 라이피릴의 병용 투여는 라이피릴 및 라이피릴라트의 AUC0-24와 Cmax를 2.5배까지 증가시켰다. 이러한 관찰 사항에 대한 임상적 연관성은 알려지지 않았다.
 - 크리마린[®]：텔미사르탄을 10일 동안 투여한 것은 와르파린의 평균 최저 혈장 농도를 약간 감소시켰다； 이러한 감소는 International Normalized Ratio (INR) 면에서의 변화를 유발하지는 않았다.
 - 비스테로이드 소염진통제 (예, 항염증요법으로서 아스피린, COX-2 저해제 및 비스테로이드소염 진통제)는 안지오텐신 II 수용체 길항제 혈압강하효과를 감소시킬 수 있다. 신기능이 손상된 일부 환자에：발산환자, 신기능이 손상된 노인 환자에서 안지오텐신 II 수용체 길항제에 COX 저해제 병용투여시 급성신부전(일반적으로 가역적임)을 포함한 신기능 손상 약화가 보고되었다. 따라서 주의하여 병용투여하며, 특히 노인 환자의 경우 더 많은 주의를 기울여야 한다.
 - 비스테로이드성 소염진통제와 이 약을 병용 투여받는 환자들에게는 충분한 수분을 공급해 주어야하며 병용치료 시작 후 주기적으로 신기능을 모니터링 해야 한다.
 - 기타 약물：텔미사르탄을 아세트아미노펜, 암로디핀, 글리베허라미드, 신바스타틴, 히드로콜로리다이즈드 및 아부프록센과 병용투여하였을 때 임상적으로 유의한 상호 작용은 없었다. 텔미사르탄은 사이토크롬 P450 시스템에 의해 대사되지만 알코올 성체에서 CYP2C19을 약간 저해하는 것을 제외하고는 사이토크롬 P450에 대해 영향을 미치지 않았다. 텔미사르탄은 사이토크롬 P450 효소를 저해하는 약물과 상호작용할 것으로 예상되지 않는다. CYP2C19에 의해 대사되는 약물의 대사를 저해할 가능성을 제외하고, 텔미사르탄은 사이토크롬 P450에 의해 대사되는 약물들과 상호작용할 것으로 예상되지 않는다.

- 추가적인 약물상호작용 정보는 텔미사르탄 단일제 허가사항을 참조한다.
- 안지오텐신 수용체 차단제(ARB), ACE억제제 또는 알리스키렌의 병용투여에 의한 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)의 이중차단은 이러한 약물의 단독요법과 비교시 저혈압, 실신, 고칼혈총증 및 신기능의 변화(급성 신부전 포함) 위험을 증가시키는 것과 관련이 있다. 이 약과 RAAS에 작용하는 다른 약물을 병용투여하는 환자의 경우, 혈압, 신기능 및 전해질을 면밀히 모니터링해야 한다. 당뇨병이나 중등증~중증의 신장애 환자(사구체여과율 (80 mL/min/1.73m²)에게 이 약과 알리스키렌 함유요법을 병용투여하지 않는다.
- 암로디핀의 약물 상호 작용
 - 임상 시험에서 암로디핀은 타이저제에 노제, 메타-치타제, 안지오텐신-전환 효소 저해제, 지속형 질산염류, 니트로글리세린, 설파질, 다극신, 와르파린, 비스테로이드성소염제, 항성제 및 경구용 당뇨병 제제 등과 안전하게 투여되었다.
 - 자용 주스：암로디핀은 자용이나 자용주스와 병용시 일부 환자에서 생체이용률을 증가로 인한 혈압강하효과의 증가가 나타날 수 있으므로, 병용투여를 권장하지 않는다.
 - 시메티딘, 실데나필：암로디핀의 약동학에 대한 유의한 영향은 없었다.
 - 아토르바스타틴, 다극신, 와르파린：임상 약물상호작용 연구에서 암로디핀에 의한 약동학적 영향은 없었다.
 - 신바스타틴：암로디핀 10 mg과 신바스타틴 80 mg을 다히 병용투여한 결과 신바스타틴을 단독으로 투여하였을 때보다 심 바스타틴에 대한 노출이 77%까지 증가하였다. 따라서 암로디핀을 복용하고 있는 환자에게는 심바스타틴 복용량을 1회 1회 20 mg으로 제한한다.
 - 타크로리무스：암로디핀과 병용투여 시 타크로리무스의 혈중 농도 증가 위험이 있지만, 이러한 상호작용의 약동학적 기전 이 완전히 이해된 것은 아니다. 타크로리무스를 투여 받은 환자에게 암로디핀을 투여하는 경우에는 타크로리무스 혈중 농도에 대한 모니터링이 필요하며 타크로리무스의 투여량을 적절히 조절해야 한다.
 - 시를로스포린：시를로스포린의 가변적인 최저 농도 증가(평균 0-40%)가 관찰되었던 신장이상 환자를 제외하고, 건강한 지 환자 또는 다른 집단에서 시를로스포린과 암로디핀으로 약물상호작용 시험이 수행되지 않았다. 암로디핀을 투여 중인 신장 이상 환자에서 시를로스포린 농도에 대한 모니터링을 고려해야 하며, 필요에 따라 시를로스포린 용량을 감량해야 한다.
 - CYP3A4 억제제：강하게거나 중등도의 CYP3A4 억제제(칸베테베소 억제제, 아를게 함진균제, 에라트로마이신 또는 클레트리트로마이신)과 같은 마이크로이드제, 메라파일 또는 딜리타렐)을 암로디핀과 병용 시 암로디핀 노출을 유의하게 증가시켜 그 결과 지혈압이 증가할 수 있다. 이러한 PK 변동의 임상적인 해석은 고령자에게서 더 뚜렷하게 나타났다 수 있다. 따라서 임상적인 모니터링 및 용량 조절이 요구될 수 있다.
 - CYP3A4 유도제：이미 알려진 CYP3A4 유도제와의 병용투여는 암로디핀의 혈장농도를 변화시킬 수 있다. 그러므로 특히 강력한 CYP3A4 유도제(예를 들어 리람피신, 성호완음 (hypenicum perforatum))와 병용투여하는 기간 및 그 이후에 혈압을 모니터링하고 용량 조절을 고려해야 한다.
 - 단독투입(주입용)：동물에서 베라파릴 및 정맥 내 단도플렌 투여 후 고칼혈총증과 연계하여 치명적인 심실세동 및 심정혈관 허혈이 관찰되었다. 고칼혈총증의 위험이 있으므로, 약성 고혈에 감수성이 있는 환자 및 약성 고혈 관리 시 암로디핀과 같은 칼슘채널차단제의 병용 투여를 피하도록 권고된다.
 - mTOR 억제제：mTOR 억제제(예, 시를리무스, 텔시리무스, 에베로리무스)는 CYP3A의 기질이다. 암로디핀은 약한 CYP3A 저해제이며, mTOR 억제제와 병용투여 시 암로디핀이 mTOR 억제제에 대한 노출을 증가시킬 수 있다.
 - 추가적인 약물상호작용 정보는 암로디핀 단일제 허가사항을 참조한다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 임부：텔미사르탄과 같은 안지오텐신 II 수용체 길항제의 사용은 임신 1기 3개월 동안은 권장되지 않으며, 27기 및 37기 3개월

동안은 금지된다. 이 약을 임신중인 여성에 투여한 적절한 자료는 없다.

비임상자료에서 기형 발생은 나타나지 않았으나 태아독성은 나타났다. 임신 27기 및 37기 3개월 동안, 안지오텐신 II수용체 길항제의 노출은 인해 태아독성 (신장기능 감소, 양수감소증, 두개골 골화 지연)과 신생아독성(신부전, 저혈압, 고칼혈총증)을 유발한다. 임신 1기 중에는 안지오텐신 II 수용체 길항제 투여를 시작해서는 안 된다. 만약 안지오텐신 II 수용체 길항제의 지속적 치료가 필수적이지 않다면, 임신을 계획 중인 환자는 임부의 사용에 대해 안전성 프로파일의 확립된 다른 고혈압 치료제로 대체하여야 한다. 임신이 진단된 경우에는 가능한 빨리 안지오텐신 II 수용체 길항제의 치료를 중단해야 하며, 만약 적절하다면, 다른 치료제로 치료를 시작해야 한다. 만약 임신 27기 3개월 이후로 안지오텐신 II 수용체 길항제에 노출된 경우, 신장 기능과 두개골 골화 검사가 권장된다. 안지오텐신 II 수용체 길항제를 복용했던 임부의 경하는 반드시 저혈압, 빈뇨, 고칼혈총증 등의 발현 가능성을 긴밀하게 관찰하여야 한다.

암로디핀의 임부에 대한 안전성은 확립되지 않았다. 인체에 대한 최대 권장 용량의 50배에 해당하는 용량의 암로디핀을 투여한 랫드에서 분만직전 및 영장이 나타나자, 동물실험에서는 암로디핀 고용량에서 생식독성이 관찰된 바 있다.

- 수유부：사람에 대한 후 연구에 따르면 암로디핀이 사람 모유중으로 이행된다고 보고된 바 있다. 텔미사르탄이 사람의 모유 중으로 이행되는지의 여부가 알려져 있지 않으나 동물실험에서는 텔미사르탄이 유즙으로 분비되는 것이 확인되었다. 그러므로 수유하는 동안에는 이 약을 투여하지 않아야 한다. (‘ 2. 다음 환자에는 투여하지 말 것’항 참조)
- 생식능：사람에서 이 약 및 개별 주성분의 생식능은 연구된 바 없다. 텔미사르탄 및 암로디핀의 병용투여한 별도의 생식독성 시험은 실시되지 않았다. 비임상시험에서 얻었 및 수컷의 수태능에 대한 텔미사르탄의 영향은 관찰되지 않았다. 칼슘채널차단제를 투여 받은 일부 환자에서 정자마리 부분의 가역적인 생화학적 변화가 보고되었다. 암로디핀이 생식능에 미치는 잠재적인 영향에 관한 임상 자료는 충분하지 않다. 한 건의 랫드 시험에서 수컷의 수태능에 미치는 유해한 영향이 발견되었다.

8. 소아에 대한 투여

이 약은 만18세 이하 소아환자에서의 안전성 및 유효성에 대한 자료가 충분치 않으므로, 투여가 권장 되지 않는다.

9. 고령자에 대한 투여

이 약을 고령자에 투여시 용량 조절이 필요하지 않으나, 일부 고령자에서 보다 민감한 반응이 나타날 수 있음을 배제할 수 없으므로 주의하여 투여한다. 75세 이상의 고령자인 경우, 암로디핀의 청소율이 감소되어 있으므로, 낮은 용량으로 치료를 시작하며, 용량을 서서히 증량한다.

10. 과량투여시의 처치

- 텔미사르탄：사람에서의 과량투여에 대한 유용한 정보는 제한적이다. 텔미사르탄 과량투여시 가장 현저한 증상으로 저혈압, 빈맥(부교감신경 자극으로 인해), 서맥, 어지러움 및 급성신부전 등이 보고되었다. 저혈압 증후가 나타나면 보조적인 치료를 실시해야 한다. 텔미사르탄은 혈액투석에 의해 제거되지 않는다. 환자를 주기적으로 관찰해야 하고 복용 후 경과시간 및 증상의 경중에 따라 다중적 보조적 치료를 실시한다. 구토와/또는 위세척을 고려할 수 도 있다. 약물면이 처치에 유용할 수도 있다. 혈청 전해질 수와 크레아티닌 수치를 자주 모니터링 해야 한다. 저혈압이 나타나면 환자를 높이고 염분과 체액 대용제를 빨리 공급해야 한다.
- 암로디핀：심한 과량투여 시 과도한 말초혈관확장과 함께 반사성 빈맥도 나타날 수 있다는 것이 현재까지의 자료에서 언급되었다. 또한, 전신성 저혈압의 증세가 심하고 오랫동안 지속되어 속성체에 이르게 되거나 속이 밀려나는 치명적인 결과로 초래되었다고 보고되었다. 건강한 지원자에서 암로디핀 10 mg을 투여한 즉시 혹은 2시간 후까지 약물면(medical carbon)을 투여하였을 때 암로디핀의 흡수가 유의하게 감소되었다. 일부 경우에는 위세척이 유용할 수 있다. 암로디핀의 과량투여로 인한 임상적으로 심각한 저혈압은 심장과 호흡기능을 자주 모니터링 하고, 사지의 위치를 골때보다 높게 유지하여 혈액을 같은 순환체에 및 노내세혈관을 충분히 확보하는 등의 적극적인 심혈관계에 대한 보조요법을 필요로 한다. 혈관수축제 사용을 금기하는 특별한 경우가 아니라면, 혈관강장제 및 혈압을 회복하는데 혈관수축제가 유용할 수 있다. 칼슘채널차단제의 효과를 반전시키는다는 칼슘클루르산염의 정맥투여가 유용할 수 있다. 암로디핀은 단백결합율이 매우 높으므로 혈액투석은 도움이 되지 않는다.

11. 보관 및 취급상의 주의사항

- 아래의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

12. 약물용동등성시험 정보

- 시험