

활성비타민으로 365일 액티브하게

베콤·씨

활성비타민 B 3종
비타민 C, E 함유

액티브정



● 베콤씨액티브정 개요 및 특징

비타민은 우리 몸의 생리기능을 조절하고 대사를 원활하게 하는 필수 영양소로 체내에서 생성되지 않기 때문에 외부로부터 섭취가 필요한 성분입니다. 베콤씨액티브정은 신경에 관여하는 비타민B군과 항산화작용을 갖는 비타민C 및 비타민E가 집중적으로 처방된 영양제로 스트레스가 많고 바쁘게 사는 현대인에게 나타나는 쉬면 육체피로, 눈의 피로, 어깨·목결림, 구내염 등의 여러 증상을 효과적으로 개선하여 줍니다. 특히 베콤씨액티브정은 체내를 수율이 높은 벤폠포티딘(활성비타민B) 등 총 3종의 활성비타민을 함유하고 있습니다(비타민 B₁, B₂, B₆).

● 성분 · 함량 1정 중

벤폠포티딘(비타민B ₁)(KP)	50mg(티아민염산염으로서 36.2mg)
리보플라빈부티레이트(비타민B ₂)(KP)	6mg
피리독살포스페이트수화물(비타민B ₆)(KP)	2.5mg
시아노코발라민100배산(비타민B ₁₂)(별규)	0.6mg(시아노코발라민으로서 6μg)
아스코르브산 과립97%(비타민C)(별규)	257.8mg(아스코르브산으로서 250mg)
토코페롤아세테이트2배산(비타민E)(KP)	100mg(토코페롤로서 50IU)

● 성상

분홍색의 타원형 필름코팅정



● 효능 · 효과

○다음경우의 비타민 E, B₁, B₂, B₆, C의 보급

- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.

●비타민B₁(벤폠포티딘)

- 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등) - 각기 - 눈의 피로

●비타민B₂(리보플라빈부티레이트)

- 다음 증상의 완화: 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

●비타민C(아스코르브산과립 97%)

- 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화

- 잇몸출혈·비출혈(코피) 예방

●비타민E(토코페롤아세테이트 2배산)

- 말초혈행장애 및 경련기시 다음 증상의 완화: 어깨·목결림, 수축저림·수축냉증(손발이 차가움)



- 용법 · 용량 만 8세 이상 및 성인: 1회 1정씩, 1일 2회 복용
※ 충분한 양의 물과 함께 복용하시기 바랍니다.

● 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 3개월 미만의 영아

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 만 1세 미만의 영아
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 고혈압·신장증 환자(hypercalcaemia: 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 4) 입부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 5) 통풍 환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자


4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중단(중지)하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 중단 시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(종혈)이 붉어짐, 구역, 구토, 붉은 변, 식욕부진, 복부팽만감
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨리거나 늦게 오지 않거나 정지될 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- 3) 헤르페스 증상을 포함한 경구염을 유발하는 여성 또는 혈전(혈관막힘)성 소인이 있는 환자가 베타나를 복용할 경우 혈전(혈관막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경 또는 신경병증 증상(neuropathy: 말초 신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 6) 흡연이 부족한 환자(비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다).
- 7) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 8) 개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우


5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정확한 용법 · 용량을 잘 지켜십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여하십시오.
- 3) 각종 요점사이에 할당의 검증을 병행할 수 있습니다.
- 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상감시하며 영향을 줄 수 있습니다.


6. 저장상의 주의사항



(1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.



(2) 저사광선을 피하고 열 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.



(3) 오염(질문 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

● 사용기한 외부포장에 표기

● 포장단위 100정

● 저장방법 기밀용기(실온보관(1~30℃))

※ 정제를 개봉 후에는 뚜껑을 꼭 닫아주십시오.(본 제품은 습기가 많은 곳에서는 보관 중 인습(흡수)되어 변색될 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.)

※ 이 의약품은 KGMPI(우수의약품제조관리기준) 적격업체 의약품으로 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오염되었거나 파손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환 하여 드려야 합니다. 정부의 '소비자문제해결기준'에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여드립니다.

※ 이 설명서의 최근 변경된 내용은 홈페이지(www.yuhan.co.kr) 또는 소비자상담실(080-024-1188)에서 확인하실 수 있습니다.

문안작성인월일: 2017. 1. 25



제조판매자

유한양행

본사: 서울특별시 동작구 노량진로 74
공장: 충북 청주시 청원구 오창읍 안구단지로 219
소비자상담실: 080-024-1188
홈페이지: www.yuhan.co.kr

J1432600/01B