

활성 비타민 3종 보강
고함량 기능성 비타민메가트루[®]
액티브정 Active

분류번호 : 319(기타의 비타민제)

● 메가트루액티브정 개요 및 특징

비타민은 미량 영양소로서, 우리 몸 안에서 생성이 되지 않기 때문에 음식물이나 영양제를 통해 공급되어야 합니다. 한 종류라도 부족하게 되면 체내에서 일어나는 여러 가지 대사에 지장을 초래하여 질병이 유발될 수 있습니다. 메가트루액티브정은 비타민B군을 고함량으로 함유하고 있으며, 활성형 비타민B군 3종 벤포티아민(B₁), 리보플라빈부티레이트(B₂), 피리독살포스페이트수화물(B₆)을 사용함으로써 체내 활성전환율을 높였습니다. 또한 항산화 성분인 비타민C, 셀레늄, 아연, 한국인에게 부족한 비타민D, UDCA 등의 성분이 함유되어 있어 육체피로, 눈의 피로, 신경통, 근육통, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후) 체력저하, 노년기 및 임신·수유기에도 좋은 제품입니다.

● 성분·함량 1정 중

벤포티아민(비타민B ₁)(KP)(티아민염산염으로서 36.2mg)	50mg
리보플라빈부티레이트(비타민B ₂)(KP)	25mg
니코틴산아미드(비타민B ₃)(KP)	25mg
피리독살포스페이트수화물(비타민B ₆)(KP)	30mg
판토텐산칼슘(비타민B ₅)(KP)	25mg
시아노코발라민100배산(비타민B ₁₂)(별규)(시아노코발라민으로서 50μg)	5mg
아스코르브산 과립97%(비타민C)(별규)(아스코르브산으로서 50mg)	51.6mg
콜레칼시페롤 과립(비타민D)(BP)(비타민D로서 400IU)	4mg
d-비오틴1%(별규)(비오틴으로서 0.1mg)	10mg
이노시톨(KP)	25mg
우르소데옥시콜산(UDCA)(KP)	15mg
셀레늄함유간조효모(Se)(KP)(셀레늄으로서 12.5μg)	23.2mg
산화아연(Zn)(KP)(아연으로서 7.6mg)	9.4mg

● 성상 분홍색의 타원형 필름코팅정



● 효능·효과

- ▶ 다음 경우의 비타민 D, B₁, B₂, B₆, C의 보급
- 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 - 발육기 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
- 비타민B₁(벤포티아민) - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등) - 각기 - 눈의 피로
 - 비타민B₂(리보플라빈부티레이트) - 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 비타민D(콜레칼시페롤과립) - 뼈, 이의 발육불량 - 구루병의 예방

● 용법·용량 만 12세 이상 및 성인 : 1회 1정, 1일 1~2회 복용

- ※ 충분한 양의 물과 함께 복용합니다.
※ 그림과 같이 정제포장의 불룩한 부분을 화살표 방향으로 누르고 알약만 꺼내 복용합니다. 이때 실수로 알루미늄 포장지를 함께 복용할 일이 없도록 합니다.(PTP 포장에 한함)



● 사용상 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 3) 만 12개월 미만의 젖먹이 4) 신장(콩팥)결석 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 (1) 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자 5) 심장·순환기계기능 장애 환자 6) 신장(콩팥)장애 환자 7) 저단백혈증 환자 8) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자 9) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의 하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 식욕부진, 복부팽만감, 피부염, 딸 - 호흡기 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종(부기)
2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
3) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부정(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
8) 우발적으로 과량복용 한 경우
9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있습니다.
4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관하십시오.
3) 오염(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

● 사용기한 외부포장에 표기

- ※ 블리스터 포장(PTP)의 제조번호 / 사용기한 표시 방법은 아래와 같습니다.
예) 제조번호 #7001, 사용기한 2019년 2월 20일인 경우 → "7001 / 190220" 로 표시

● 포장단위 10정/PTP, 60정/병, 120정(60정/병X2)

● 저장방법 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

- ※ 정제를 꺼낸 후에는 뚜껑을 꼭 닫아주십시오.(본 제품은 습기가 많은 곳에서는 보관 중 인습(흡습)되어 변색될 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.)(병포장에 한함)

- ※ 이 의약품은 KGMP(우수의약품제조관리기준) 적격업체 의약품으로 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 파손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 정부의 "소비자분쟁해결기준"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

- ※ 이 설명서의 최근 변경된 내용은 홈페이지(www.yuhan.co.kr) 또는 소비자상담실(080-024-1188)에서 확인하실 수 있습니다.

문안작성연월일 : 2017년 1월 26일



제조판매자

유한양행

본사: 서울특별시 동작구 노랑진로 74
공장: 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 219
소비자상담실: 080-024-1188
홈페이지: www.yuhan.co.kr

JL463181/01B