

활성형 신경비타민 + 감마오리자놀 이 함유된

근육경련 및 혈액순환 개선제

# 비나플러스

연질  
캡슐

Venaplus Soft Capsule



## 원료약품 및 그 분량

이 약1캡슐(1,615mg) 중

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 토코페롤아세테이트(비타민E로서 500IU)(KP).....  | 500mg |
| 산화마그네슘(마그네슘으로서 150.78mg)(KP)..... | 250mg |
| 피리독신염산염(USP).....                 | 50mg  |
| 티아민질산염(KP).....                   | 27mg  |
| 벤포티아민(티아민염산염으로서 16.63mg)(KP)..... | 23mg  |
| 감마오리자놀(KP).....                   | 10mg  |
| 착색제(타르색소): 적색40호, 황색5호, 청색1호      |       |

성상 회백색의 유상 내용물을 함유한 암갈색의 장방형 연질캡슐

## 효능효과

- 다음 경우의 비타민 E, B1, B6 의 보급
  - 육체피로, 임신 · 수유기, 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시, 노년기
- 이 약에 함유된 티아민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.
  - 말초혈행장애 및 갱년기 시 다음 증상의 완화 : 어깨 · 목경림, 수족저림 · 수족냉증(손발이 차가움)
  - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
  - 각기, 눈의 피로
  - 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

용법용량 만 12세 이상 및 성인 1일 2회, 1회 1캡슐 복용

## 사용상 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
  - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
  - 만 12개월 미만의 젖먹이
  - 심한 증상의 신부전 환자
  - 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
  - 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
  - 의사의 치료를 받고 있는 환자
  - 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
  - 심장 · 순환기계기능 장애 환자
  - 신장장애 환자
  - 저단백혈증 환자
  - 임부
  - 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
  - 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
  - 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
  - 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
  - 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
  - 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
  - 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
  - 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여(함께 복용)시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
  - 우발적으로 과량복용 한 경우
  - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
  - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
  - 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피할 것.
  - 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조정한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여 받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
- 저장상의 주의사항
  - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
  - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
  - 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 60캡슐/PTP, 120캡슐/PTP

- \* 본 의약품은 KGMP 적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국 및 의약품 판매자를 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의 및 이 첨부문서의 작성일자(2017년 02월 27일)이후 변경된 내용의 확인은 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 또는 홈페이지([www.yuyu.co.kr](http://www.yuyu.co.kr))나 크로바서비스(수신자요금부담)080-070-0701으로 하시기 바랍니다.
- \* 제품의 효과적인 사용을 위해 첨부문서를 주의 깊게 읽어 주시고, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
- \* 연질캡슐이 녹거나 변형될 수 있으므로 직사광선 및 고온 다습한 곳을 피하여 보관하시기 바랍니다.

판매원 (주)유유제약

충청북도 제천시 바이오밸리 1로 94

제조원



코스맥스바이오(주)

충청북도 제천시 바이오밸리3로 30