

고함량 기능성 비타민

벤포맥스100정

벤포티아민100mg 함유 비타민B 복합제

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

벤포티아민(KP).....	100mg
리보플라빈(KP).....	100mg
피리독신염산염(KP).....	100mg
판토텐산칼슘(KP).....	108.7mg
시아노코발라민1000배산(시아노코발라민으로서100μg)(KP).....	100mg
제피아스코르브산(아스코르브산으로100mg)(별규).....	103.1mg
니코틴아미드(KP).....	10mg
폴산(KP).....	0.1mg
비오틴(USP).....	0.1mg
이노시톨(KP).....	50mg
신화아연(아연으로서25mg)(KP).....	31.2mg
콜린타르타르산염(USP).....	20mg
γ-오리자놀(KP).....	10mg
셀레늄함유건조효모(셀레늄으로서10.8μg)(KP).....	20mg
우루소데옥시콜산(KP).....	15mg

[성상] 적갈색의 타원형 필름코팅정

[효능·효과]

- 다음경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, C 의 보급
 - 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염.
 - 각기 - 눈의 피로

3. 아연의 보급

[용법용량] 만 12세 이상 및 성인: **1일 1회, 1회 1정 식후** 복용

[사용상의 주의사항]

1) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

(1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 (2) 만 12개월 미만의 젖먹이

2) 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

(1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 (2) 레보도파

3) 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

(1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 (2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산화이 배설되는 상태) (3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 (4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자 (5) 심장·순환기계기능 장애 환자 (6) 신장장애 환자 (7) 저단백혈증 환자 (8) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자

4) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 - 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종, 피부염, 땀.호흡시 악취, 탈모, 조금증 (2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. (3) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. (4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μg이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. (5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진 시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사 하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. (6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. (7) 항알도스테로제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. (8) 우발적으로 과량복용 한 경우

(9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5) 기타 이 약의 복용 시 주의사항

(1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. (2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다. (3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다. (4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6) 저장상의 주의사항

(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것. (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[포장단위] 50정/병, 100정(50정/병 X 2)

[소비자상담실] 080-024-0030

[제조원] 한풍제약 / 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 301, 봉동로 705

[판매원] 광동제약(주) / 경기도 평택시 산단로 114

· 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

· 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.

· 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

· 자세한 사항은 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

첨부문서 작성일 : 2017년 05월 10일