

당신만을 위한 비타민 한알에 담은 최고의 가치

테라젠비타골드정

우수의약품제조관리기준
KGMP적격지정업체
일반의약품
분류번호 : 319

■ 성분·함량 : 1정 중

벤포타아민(KP)	100mg
(티아민염산염으로서 72.3mg)	
유비데카레논(KP)	10mg
γ-오리자놀(KP)	5mg
시아노코발라민1000배산(KP)	100mg
(시아노코발라민으로서 100μg)	
우르소데옥시콜산(JP)	15mg
리보플라빈(KP)	100mg
피리독산염산염(KP)	100mg
니코틴아미드(KP)	10mg
아스코르브산(KP)	50mg
콜레칼시페롤농축물(분말형)(BP)	4mg
(비타민 D로서 400IU)	
토코페롤아세이트농축물(분말형)(EP)	20mg
(비타민 E로서 10IU)	
비오틴(USP)	100μg
폴산(KP)	100μg
판토텐산칼슘(KP)	10.87mg
아노시톨(KP)	50mg
콜린타르타르산염(NF)	100mg
산화아연(KP)	31.2mg
(아연으로서 25mg)	
산화마그네슘(KP)	20mg
(마그네슘으로서 12mg)	

첨가제(타르색소) : 황색4호알루미늄레이크, 황색203호알루미늄레이크, 적색40호알루미늄레이크

■ 성분·미량성 내지 황색의 타원형 필름코팅정

■ 효능·효과

1. 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, B₁₂, C, D, E의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하
- 발육기
- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절염(요통, 어깨갈림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 각기
- 눈의피로
- 뼈, 이의 발육불량
- 구루병의 예방

2. 아연의 보급

■ 용법·용량

만 12세 이상 및 성인 : 1일 1회 1정 식후 복용

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia) : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcolidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환, 신장(콩팥)질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 4) 신장(콩팥)결석 환자
- 5) 심한 증상의 신부전 환자
- 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

이 약은 황색4호(타르타르진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
- 4) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 5) 신장(콩팥)장애 환자
- 6) 저단백혈증 환자
- 7) 동통환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
- 8) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
- 9) 임부

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
- 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(종혈)이 붉어짐, 붉은 변, 붉은 반점, 부전 수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- 3) 테스트로건을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 D를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가할 수 있습니다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 100μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 9) 황알도스테론계, 트리암테렌과 병용투여(함께 복용)시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 10) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
- 2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있습니다.
- 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.
- 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관
■ 사용기간 : 제조일로부터 36개월
■ 포장단위 : 45정, 90정(45정×2), 60정, 120정(60정×2)
■ 제조회사 : (주)테라젠이텍스 (경기도 안산시 단원구 산단로68번길 58)
■ 판매처 : (주)유한양행 (서울특별시 동작구 노량진로 74)

제조사 :  테라젠이텍스

판매처 :  유한양행

* 의약품 사용하기 전에 첨부문서(설명서)를 주의 깊게 읽어야 하며, 이 첨부문서(설명서)를 의약품과 함께 보관하십시오.

* 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.

* 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP) 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

* 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회고시(소소비자 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품 판매업자를 통해 교환 받을 수 있습니다.

* 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품사전(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하세요.

* 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사 또는 한국약물관리전관리원(의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.

* 이 첨부문서의 개정일 이후 변경된 내용은 02)3463-7111이나 www.etexp.com 에서 확인할 수 있습니다.