

디유비정

D-Yu Bee Tablet

- ※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- ※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않습니다.
- ※ 의약품을 사용하는 동안에는 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

디메티콘(NF)	15.0 mg
우르소데옥시콜산(KP)	10.0 mg
비사코딜(EP)	3.0 mg
첨가제(타르색소) : 청색1호알루미늄레이크	

【성상】

파란색의 원형 필름코팅 장용정

【효능·효과】

- 변비
- 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내 이상발효, 치질

【용법·용량】

15세 이상 및 성인, 1회 1~2정, 1일 2회 아침, 저녁 공복시(식전 또는 식간)에 복용한다. 다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 급성 복부질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자
 - 2) 장폐색(창자마힘) 환자
 - 3) 만 7세 이하의 어린이
 - 4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것.

제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자
 - 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
 - 4) 직장암의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람

- 다음과 같은 사람의 경우 이약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약을 복용함으로써 발진·충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한복통(배 아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우
 - 2) 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감, 경련이 일어날 경우
 - 3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 반드시 필요한 경우 이외에는 만 10세 이하의 어린이는 복용을 피하는 것이 바람직하다.
 - 3) 복용 시 정제를 씹지 말 것.
 - 4) 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것.
- 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
 - 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

30정/병, 300정/병

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 유통과정에서 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다. 작성일 이후 변경된 내용은 '온라인 의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)'을 참조하십시오.

작성연월일 : 2017. 02. 21
EJ3961-00

(주)휴온스

충청북도 제천시 바이오밸리로 100
소비자 상담실(반품 및 교환처) : 080-447-4700

 **Huons**