

아말피정

※ 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

L-류신(KP)	17mg
L-메티오닌(KP)	15mg
L-발린(KP)	15mg
L-아소류신(KP)	15mg
L-트레오닌(KP)	10mg
L-페닐알라닌(KP)	10mg
L-트립토판(KP)	5mg
L-리신염산염(KP)	18.75mg
L-아르기닌염산염(KP)	10mg
티아민질산염(KP)	5mg
토코페롤수시네이트칼슘(KP)	2.5mg
(d-α 토코페롤수시네이트로서 2.41mg)	
리보플라빈(KP)	2mg
니코틴산아미드(KP)	15mg
피리독신염산염(KP)	7.5mg

첨가제(동물유래성분) : 유당(젓당)수화물(소/우유)

【성 성】 진한 갈색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】 자양강장, 허약체질, 육체피로, 병중병후(병을 앓는 동안이나 회복 후), 위장장애, 영양장애, 발달성소모성질환, 임신수유기 등의 경우의 영양보급

【용법·용량】 15세 이상 청소년 및 성인 : 1회 2정, 1일 1~2회 복용하십시오.

소아(7~14세) : 1회 1정, 1~2회 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 중증(심한 증상)의 신부전환자
- 3) 7세 미만 소아
- 4) 이 약은 유당(젓당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젓당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오. (복용전 의사 또는 약사와 상의합니다.)

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부·수유부

3. 이상반응

- 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
- 위부(상복부)불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(홍혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변
- 2) 이 약 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
- 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성(혈관 막힘) 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증(혈관 막힘)의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 5) 고용량투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성)손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력장애), 과요산혈증(hyperuricemia : 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 투여합니다.
- 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.
5. 상호작용
1) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 복용)투여하지 않습니다. 가)레보도파
6. 임상검사치에의 영향
1) 요(소변)를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
7. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관합니다.
- 3) 오용(잘못 사용)·남용을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관합니다.
- 4) 사용기한을 넘긴 제품은 복용하지 마십시오. 또한 사용기한 내에 있더라도 개봉 후 6개월 이내에 복용합니다. (품질유지를 위한)
- 5) 다른 용기에 옮겨 보관하지 마십시오.

【포장단위】 300정

【저장 및 사용기간】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 24개월

【제조회사】 (주)아이윌드제약 / 인천광역시 남동구 함박외로 316(논현동)

【제조자】 (주)마더스제약 / 경상북도 경산시 진량읍 공단6로 24길 18

【판매자】 투원파마(주) / 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-23

- ◎ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁 해결기준에 따라 교환·환불 받을 수 있습니다.
- ◎ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- ◎ 사용(유효)기한이 지난 의약품을 사용하지 마십시오.
- ◎ 어린이 손에 닿지 않게 보관하십시오.
- ◎ 최신의약품 정보 : 식품의약품안전처 온라인약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품검색창
- ◎ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.