

보험 급여 적용되는 이명치료제

메네신 정

(Betahistine HCl)

우수의약품제조관리기준

KGMP적격지정업체

전문의약품

분류번호 : 116

- **성분·함량** : 1정 중
베타히스틴염산염(BP) 16mg
- **성상** : 흰색의 원형 정제
- **효능·효과**
메니에르병에 의한 어지러움, 이명, 청력 소실
- **용법·용량**
성인 : 초기 용량으로 1회 베타히스틴염산염으로서 16mg, 1일 3회 식사와 함께 경구투여한다. 유지 용량으로 보통 1일 베타히스틴염산염으로서 24~48mg을 투여한다.
- **사용상의 주의사항**
- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 부신증양 환자
 - 크롬친화세포종 환자
 - 이 약의 성분에 과민증이 있는 환자
 - 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 소화성 궤양의 병력이 있는 환자 또는 활동성 소화성 궤양 환자
 - 천식 환자
 - 항히스타민제를 투여중인 환자
 - 이상반응
 - 소화기계 : 소화불량 등이 나타날 수 있다. 베타히스틴염산염을 복용한 환자에서는 설사, 식욕부진, 복부팽만감 드물게 구역, 구토, 위통 등이 보고되었다.
 - 기타 : 두통, 가려움증, 피부발진 등이 나타날 수 있다. 베타히스틴염산염을 복용한 환자에서는 두드러기, 심계항진, 홍분감, 홍통, 발한, 일시적인 홍반성 발진 등이 보고되었다.
 - 상호작용
항히스타민제와 병용시 이 약의 작용을 감소시킨다는 보고가 있으므로 신중히 투여한다.
 - 임부에 대한 투여
임신중 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회하는 경우에만 투여한다.
 - 소아에 대한 투여
소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다.).
 - 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 용량을 감소하는 등 주의한다.
 - 과량투여시의 처치
과량투여가 드물게 보고되었다. 2명의 환자가 베타히스틴염산염으로서 200mg 이상의 용량에서 일시적인 경동도 내지 중등도의 증상(구강건조증, 복통, 졸림, 구역)을 경험하였다. 베타히스틴염산염으로서 728mg을 복용한 경우 경련이 보고되었다. 모든 경우 과량투여시의 증상은 완전히 회복되었다.
과량투여시의 처치는 일반적인 보조 처치를 실시해야 한다.
 - 보관 및 취급상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 햇빛 및 습도를 피하여 보관한다.
 - 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않다.
- **저장방법** : 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관
- **사용기간** : 제조일로부터 24개월
- **포장단위** : 30정, 500정
- **제조판매자** : (주)테라젠이텍스 / 경기도 안산시 단원구 산단로68번길 58 (초지동)



※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하고, 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP) 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
※ 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회고시(소비자 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품 판매업자를 통해 교환 받을 수 있습니다.
※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하세요.
※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.
※ 이 첨부문서의 개정일 이후 변경된 내용은 02)3463-7111이나 www.etexpfarm.com 에서 확인할 수 있습니다.