

• 칼슘채널 차단제 •

노바닐정 5mg

(암로디핀베실산염)

【원료약품의 분량】 1정 중

암로디핀베실산염(USP)..... 6.944mg
(암로디핀으로서 5mg)

【성 상】 흰색의 팔각형 정제로 앞면에 NS, 뒷면에 AB, 57가 음각 되어 있다.

【효능·효과】

- 고혈압, 관상동맥의 고경맥화(연경형협심증) 또는 관상혈관계의 혈관경련과 혈관수축(이형협심증)에 의한 심근경색증
- 최근 혈관조영술로 관상동맥질환이 확인된 환자로 심부전이 없거나 심박출량이 40% 미만인 아닌 환자의
- 협심증으로 인한 인원의 위험성 감소
- 관상동맥 혈관재상술에 대한 위험성 감소

【용법·용량】

성인 : 암로디핀으로서 1일 1회 5mg을 경구투여하며 환자의 반응에 따라 1일 최고 10mg까지 증량할 수 있다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에게는 투여하지 말 것
1) 이 약 또는 다른 디하이드로피리딘계 약물 (암로디핀은 디하이드로피리딘계 칼슘채널차단제이다) 에 과민증의 병력이 있는 환자
2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
3) 중증의 간기능장애 환자
4) 중증의 대동맥판협착증 환자
5) 속 환자

- 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 중증의 저혈압 환자
- 2) 투석을 해야 하는 신부전 환자
- 3) 고령자

3. 이상반응

- 1) 암로디핀은 내약성이 좋다. 고혈압 및 협심증환자에 대한 위약대조 임상시험에서, 가장 흔하게 나타난 이상반응은 다음과 같다:
혈관계: 홍조
전신: 피로, 부종, 심혈관계: 심계항진
중추 및 말초신경계: 현기증, 두통, 졸음
소화기계: 복통, 오심
임상시험에서 이 약과 연관되어 임상적으로 유의한 실험실검사 이상은 관찰되지 않았다.

- 2) 시판 후 비교적 적은 빈도로 관찰된 이상반응은 다음과 같다:

- 전신: 무력, 권태감, 통증, 체중의 증가/감소
혈관계: 저혈압, 혈관염
신경계: 긴장완전, 감각저하/감각이상, 말초신경병증, 실신, 미각이상, 진전, 추체외로 장애
생식기계: 발기기능장애, 여성형 유방
소화기계: 배변습관의 변화, 구강건조, 소화불량(위염), 치은 비후, 췌장염, 구토
대사/영양: 고혈당
관절계: 관절통, 오동, 근육경련, 근육통
혈액 및 림프계: 백혈구감소증, 혈소판감소증
정신계: 불안, 기분변화
호흡기계: 기침, 호흡곤란, 비염
피부/부속기: 탈모, 다한증, 자반병, 피부 변색, 두드러기
감각기계: 귀에서 소리가 남, 시각이상
노화기계: 배뇨빈도 증가, 배뇨장애, 야뇨증
간단노화: 간염, 황달, 간혹초치의 상승 등이 매우 드물게 보고되었으며, 이들의 대부분은 담즙유체성과 관련이 있었다. 원인이 필요할 만큼 중증이었던 일부 경우에는 암로디핀의 사용과 연관이 있다고 보고되었으나, 대부분 많은 경우에서는 암로디핀과의 인과관계를 분명화하지 않았다.
- 드물게 소양증, 발진, 혈관부종, 다형성홍반을 포함한 알레르기반응이 보고되었다.
- 3) 다른 칼슘채널 저해제와 마찬가지로 다량의 이상반응들이 드물게 보고되었는데 이들이 기저질환으로 인한 것 아닌 약물에 의한 것인지는 구별을 할 수 없었다: 심근경색, 부정맥(서맥, 심실성빈맥, 심방성세동 포함), 홍통
- 4) 기타 다음과 같은 이상반응이 관찰되었다.
심혈관계: 때때로 혈압강하, 동맥질환, 또는 방실블록, 드물게 복부불쾌감 등이 나타날 수 있다.
소화기계: 때때로 심오부종, 설사, 묽은 변, 변비 등이 나타날 수 있다.
피부: 드물게 피부홍종증, 반점상 발진 등이 나타날 수 있다.
기타: 때때로 두통, 열감, 내당력저하, 쇠약 등이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 심부전환자에 대한 투여: 허혈성 병인이 없는 뉴욕심장학회(NYHA) III, IV등급의 심부전환자에 대한 암로디핀의 장기간, 위약대조시험 (PRAISE-2) 에서 암로디핀은 위약과 비교 시 심부전의 악화를 유의적인 차이가 없음에도 불구하고 폐부종 보고의 증가와 연관이 있었다.
- 2) 간기능 손상환자에 대한 투여: 모든 칼슘 antagonist의 마찬가지로 암로디핀의 반감기는 간기능부전환자에서 길어졌으며, 이들 환자에 대한 권장용량은 확립되지 않았다. 그러므로, 이런 환자들은 주의하여 투여한다.
- 3) 혈장중 노반갑기가 길어 투여를 중단한 후에도 완전한 혈압안정화작용이 나타나므로, 투여 중지 후 다른 혈압강하제를 투여하는 경우에는 용량 및 투여간격에 주의하고 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여한다.
- 4) 효과발현이 천천히 나타나므로 응급 치료를 요하는 불안정형협심증에는 효과를 기대할 수 없다.
- 5) 운전 및 기계운전에 대한 영향
암로디핀의 임상적 사용경험에 근거하여 볼 때 암로디핀은 운전 또는 기계사용능력을 저하시키지는 않는 것으로 보인다.
6. 상호작용
1) 암로디핀은 티아지드계 이뇨제, 알파 차단제, 베타 차단제, ACE저해제, 작용시간이 긴 질산염제제, 니트로글리세린 설하정, 비스테로이드성 소염제, 항생제, 경구 혈당강화제와 병용 시 안전하였다.
- 2) 사망률정를 이용한 실험실적자료는 암로디핀이 디곡신, 페니토인, 와파린, 인도메타신의 단백질결합에 영향을 미치지 않는다는 것을 알리준다.
- 3) 작용수소: 20명의 건강한 자원자에게서 240mL의 작용수소와 암로디핀 10mg의 단회병용투여는 암로디핀의 약동학에 유의한 영향을 미치지 않았다. 이 시험에서 암로디핀의 주 대사경로인 CYP3A4에서의 유전적 다형성 (genetic polymorphism)에 대한 영향력은 이루어지지 않았다. 따라서, 암로디핀은 작용이나 작용수소와 병용 시 일부 환자에서 생체이용률 증가로 인한 혈압강하 효과의 증가가 나타날 수 있으므로, 병용투여를 권장하지 않는다.
- 4) 단트론헤 (주제): IV를 통해 배라파린, 단트론헤를 투여하는 동물실험에서 치명적인 심실연축이 지속적으로 관찰되었다. 암로디핀과 단트론헤의 동시투여는 피해야 한다.
- 5) 비록로렌: 혈압강하 효과를 증가시키므로, 필요한 경우 혈압과 용량을 주의하여 투여한다.
- 6) 클라리트로마이신: 클라리트로마이신은 시트코롬 P3A4 저해제이다. 클라리트로마이신은 이 약과 병용투여 시 혈압의 위험이 증가하였다.
이 약과 클라리트로마이신을 병용투여 시 환자를 주의깊게 관찰하는 것이 권장된다.
- 7) 다른 약물들이 암로디핀에 미치는 영향
(1) 시메티딘: 암로디핀과의 병용투여 시 암로디핀의 약동학에 영향이 없었다.
(2) 알부미늄/마그네슘 (제산제): 알부미늄/마그네슘 제산제와 단회용량의 암로디핀과 병용투여 시 암로디핀의 약동학에 유의적인 영향이 없었다.
- (3) 실데나필: 원발성 고혈압환자에게 실데나필 100mg 단회용량의 투여는 암로디핀의 약동학적 파라메타에 영향을 미치지 않았다. 암로디핀과 실데나필을 병용투여 시, 각 약물은 단독으로 각각의 혈압치하하하를 발휘한다.
- (4) 시트코롬 P3A4 저해제: 고령의 (만 69세 ~ 87세) 고혈압환자에서 1일 1회 5mg과 암로디핀 5mg의 병용투여는 암로디핀의 전신노출을 57%까지 증가시켰다. 건강한 지원자 (만 18~43세) 에서 에트리로마이신의

- 병용투여는 암로디핀의 전신노출을 유의적으로 변화시키지 않았다(AUC의 22% 증가). 비록, 이에 대한 임상적 연관성은 밝혀지지 않은 것으로, 고령자에서 약동학적 변화가 더 나타날 수 있다. 강력한 시트코롬 P3A4 저해제 (예, 케토코나졸, 이트라코나졸, 리토나비어)가 암로디핀의 혈장 농도를 딜타라펠과 병용투여에서 나타난 것보다 더 높은 수치로 증가시킬 가능성은 배제할 수 없다. 암로디핀은 시트코롬 P3A4 저해제와 병용투여 시 주의하여 투여한다. 그러나, 이런 약물상호 작용으로부터 기인한 이상반응은 보고된 바 없다.
- (5) 시트코롬 P3A4 유도제: 시트코롬 P3A4 유도제가 암로디핀에 미치는 영향에 대한 시험은 수행되지 않았다. 시트코롬 P3A4 유도제에, 리피라민, 세인트 존스 워트(hypericum perforatum)와의 병용투여는 암로디핀의 혈장 농도를 감소시킬 수 있으므로 주의하여 투여한다.
- (6) 암로디핀이 다른 약물들에 미치는 영향
(1) 아토르바스타틴: 아토르바스타틴 80mg과 암로디핀 10mg 다회용량을 병용투여 시 아토르바스타틴의 항정 약동학적 파라메타에 유의적인 변화가 없었다.
- (2) 디곡신: 건강한 지원자에게 암로디핀과 디곡신을 병용투여 시 혈청디곡신의 수치 혹은 디곡신의 신장 클리어런스에 변화가 없었다.
- (3) 에탄올 (알코올): 10mg 암로디핀의 단회 및 반복투여 시 에탄올의 약동학에 유의적인 변화가 없었다.
- (4) 와파린: 암로디핀과 와파린의 병용투여 시 와파린-프로트롬빈 반응시간에 영향이 없었다.
- (5) 시클로스포린: 신장기능을 대상으로 시클로스포린과 이 약을 병용투여한 여러 연구에서, 이 약과 병용투여 시 시클로스포린의 최저혈중농도는 변화가 없거나 40%까지 증가하는 것으로 보고되었다.
- (6) 타크로리무스: 이 약과 병용투여 시 타크로리무스의 혈중농도 증가 위험이 있으므로 타크로리무스 치료 받는 환자에게 이 약 투여 시 타크로리무스의 혈중농도를 모니터링하고, 타크로리무스의 투여량을 적절히 조정하여 타크로리무스 독성을 피하도록 해야 한다.
- (7) 실바스타틴: 암로디핀 10mg과 실바스타틴 80mg의 다회용량 병용투여는 실바스타틴 단독투여와 비교하여 실바스타틴의 노출을 77%정도 증가시켰다. 암로디핀을 투여받는 환자에서 실바스타틴 1일 최대 투여용량은 20mg까지이다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 이 약의 임부에 대한 안전성은 확립되지 않았다. 인체에 대한 최대 권장 용량의 50배에 해당하는 용량의 암로디핀을 투여한 랫드에서 분만직전 및 임신이 나타난 것 외에 동물에 있어서 생식독성은 증명되지 않았다. 따라서, 임부에 대한 투여는 다른 안전한 대체약물이 없는 경우 및 질환 자체가 모체 및 태아에 큰 위험을 줄 경우에만 투여가 권장된다. 이 약을 투여한 랫드에서 수태능에 대한 영향은 없었다.
- 2) 이 약의 수유부에 대한 안전성은 확립되지 않았다. 따라서, 이 약을 투여하는 동안에는 수유를 중단하는 것이 권장된다.

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성 및 유효성은 확립되어 있지 않다.

8. 고령자에 대한 투여

일반적인 용량을 투여하는 것이 권장된다. 암로디핀을 고령자 및 젊은 연령의 환자에게 비슷한 용량으로 투여 시, 내약성이 동일하게 알려졌다.

9. 과량투여시의 처치

심한 과량투여 시 과도한 말초혈관확장과 함께 반사성 빈맥도 나타날 수 있다는 것이 현재까지의 자료에서 언급되었다. 또한, 전신성 저혈압의 증세가 심하고 오랫동안 지속되어 속삭태에 이르게 되거나 속이 일어나는 치명적인 결과가 초래되었다고 보고되었다. 건강한 지원자에게 암로디핀 10mg을 투여한 즉시 혹은 2시간 후까지 활성탄 (activated charcoal)을 투여하였을 때 암로디핀의 흡수가 유의하게 감소되었다. 일부 경우에는 위세척이 유용할 수 있다. 이 약의 과량투여로 인한 임상적으로 심각한 저혈압은 심장과 호흡기능을 자주 모니터링하고, 사지의 위치를 돌체보다 높게 유지하여 혈액투과 같은 순환체 및 노폐물량을 충분히 확보하는 등의 적극적인 실험관개에 대한 보조요법을 필요 한다. 혈관수축제 사용을 금기하는 특별한 경우가 아니라면, 혈관 긴장력 및 혈압을 회복하는데 혈관수축제에 유용할 수 있다. 칼슘채널저해제의 효과를 반전시키는데 칼슘글루투나신염의 정맥투여가 유용할 수 있다. 암로디핀은 단백질결합률이 매우 높으므로 혈액투석은 도움이 되지 않는다.

10. 의약품동등시험 정보

- 가. 시험약 암로디핀정 5밀리그램(위드스탁약주)*와 대조약 노바스크정 5밀리그램(한국화이자제약주)을 2x2 교차 시험으로 각각 1정(시험약)과 1정(대조약)씩 건강한 성인 29명에게 공복 시 단회 경구 투여하여 혈중 암로디핀을 측정하고, 비교평가항목치(AUC, Cmax)를 로그변환하여 통계처리 하였을 때, 평균치 차이 90% 신뢰구간이 log0.8에서 log1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

(암로디핀)

구분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _{0-72h} (ng · hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	노바스크정 5 밀리그램 (한국화이자제약주)	98.32 ± 20.45	2.997 ± 0.555	5.0 (5.0~7.0)	35.16 ± 6.34
시험약	암로디핀정 5 밀리그램 (위드스탁약주)	96.81 ± 20.93	2.936 ± 0.588	5.0 (5.0~7.0)	36.05 ± 5.05
90% 신뢰구간* (기준 : log 0.8 ~ log 1.25)		log0.9538~ 1.0106	log0.9458~ 1.0063	—	—

(AUC, C_{max}, t_{1/2}; 평균값 ± 표준편차, T_{max}; 중앙값(범위), n = 29)

AUC: 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 까지의 혈중농도-시간곡선하면적

C_{max}: 최고혈중농도

T_{max}: 최고혈중농도 도달시간

t_{1/2}: 말단 소실 반감기

* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간

주 1. 이 약은 위드스탁약주 암로디핀정 5 밀리그램과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 전 공정을 위드스탁약주에 위탁 제조하였음

11. 기타

1) 발발성

암로디핀 0.5, 1.25, 2.5mg/kg/day를 2년동안 먹이 속에 투여한 랫드 및 마우스에서 발발성의 증가는 나타나지 않았다. 또한, 이 시험에서 투여된 최대용량은 마우스의 최대 내약성용량 (Maximum Tolerating Dose)에 근접하였다(마우스에서는 mg/m²기준으로 임상 최대 권장용량인 10mg에 근접한 용량, 랫드에서는 임상 최대 권장용량의 2배)·

2) 들뜬반응

들뜬반응 시험에서 이 약은 유전자 혹은 크로모솜 수치에 영향을 미치지 않았다.

3) 수태율 이상

10mg/kg/day용량까지의 암로디핀 (mg/m²기준으로 임상 최대 권장용량인 10mg의 8배)으로 치한 랫드 (교미후 수컷은 64일 동안, 암컷은 14일 동안 처치)에서 수태능에 대한 영향은 나타나지 않았다.
* 환자의 체중 50kg 기준

4) 건강한 성인에서 암로디핀정 10mg과 암로디핀구강붕해정 10mg을 공복상태에서 단회투여 시 AUC 및 Cmax가 생물학적으로 동등하였다.

【저장방법 및 사용기한】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【포 장 단 위】 30정, 300정

【제 조 자】 위드스탁약주) 경기도 안성시 미양면 제2공단2길 103

【제조외의지】 한국화이자제약(주) 충북 음성군 금강역 금강로 271-8

*본 약품들은 엄격한 품질관리를 통해 제품입니다. 만약 구입한 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질 또는 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

*반드시 설명서를 읽은 후 사용(복용)하시고, 설명서는 약과 함께 보관하십시오.

*이 처방 문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 (02)588-0941에서 확인할 수 있습니다.

*제품의 유효기간은 약봉지에 표시되어 있습니다.

*첨부서류에 기재되지 않은 부작용이 나타나실 경우 의사·약사 또는 식품의약품안전처 (이디지드 → 보고방망 → 안전정보)에 의약품(제제)과 보고에 알려주시기 바랍니다.

*정확도를 높이 설명 및 기타 자세한 약품정보는 식품의약품안전처 온라인 의약품도서관 (http://drug.mds.go.kr)을 참조하십시오.

최종개정일자 2017. 05. 12

판매원

NIELSON 한국노신제약

충북 음성군 금강역 금강로 271-8

소비자 상담실 (02)588-0941