

엘비타정

Elvita Tablet

- ※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- ※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 의약품을 사용하는 동안에는 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

티아민질산염(KP)	1.3 mg
리보플라빈(KP)	12.0 mg
니코틴아미드(KP)	10.0 mg
피리독신염산염(KP)	15.0 mg
콜레칼시페롤농축분말(BP)	0.5 mg (50 IU)
토코페롤아세테이트(KP)	10.0 mg (100 IU)
첨가제(타르색소) : 오파드라이AMB노란색(80W22608) 중 황색203호 알루미나노레이크, 황색5호 알루미나노레이크, 청색2호 알루미나노레이크	

【성상】

노란색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

다음 경우의 비타민 D, E, B₁, B₂, B₆의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하
- 발육기
- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능효과는 다음과 같다.

- 비타민D (토코페롤 아세테이트)
 - 말초혈행장애 및 경년기시 다음 증상의 완화: 어깨·목·팔, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
 - 비타민B₂ (리보플라빈)
 - 다음 증상의 완화: 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

【용법·용량】

만 8세 이상의 소아 및 성인: 1회 1정, 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자(비타민 D 또는 칼슘 함유제제)
 - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 3) 만 3개월 미만의 젖먹이
 - 4) 신장결석 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 레보도파(피리독신 함유제제)
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 만 1세 미만의 젖먹이
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미국아, 유아
 - ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
- 5) 신장결석 병력이 있는 환자
4. 다음과 같은 경우 이약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - : 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적, 묽은 변
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
 - 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 D를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
 - 4) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - 5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
 - 6) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용시 주의사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것
 - 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상 검사치에 영향을 줄 수 있다.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
 - 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장량】

300정/병

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 유통과정에서 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다. 작성일 이후 변경된 내용은 '온라인 의약품도서관(<http://drug.mds.go.kr>)'을 참조하십시오.

작성연월일 : 2017. 03. 07
E.0962-00

제조사 : (주)휴온스

충청북도 제천시 바이오밸리로 100

제조의뢰자 : (주)휴니즈

부산광역시 강서구 독산단166로 22

소비자 상담실(반쯤 및 교환처) : 080-608-7000

