

부티렌 정

(애엽95%에탄올 연조엑스(20→1))

KGMP
적격업체전문의약품
분류번호 232

급 · 만성 위염 개선제

부티렌 정

(애엽95%에탄올 연조엑스(20→1))

【원료약품 및 그 분량】 1정(345.0mg) 중

- 유효성분: 애엽95%에탄올 연조엑스(20→1)(별규) 60.0mg
(유평틸린으로서 0.48~1.44mg, 자세오시딘으로서 0.15~0.45mg)
- 첨가제(타르색소): 황색203호 알루미늄레이크, 청색1호 알루미늄레이크
- 첨가제(동결유래): 유당수화물(기원: 소, 사용무위: 우유)
- 기타 첨가제: 히드록시프로필셀룰로오스, 라우릴황산나트륨, 규산겔층, 폴리도덱사산하규소, 탄산수소나트륨, 시트르산수화물, 크로스카멜로오스나트륨, 미결장셀룰로오스(101), 전분글리콜산나트륨, 미결장셀룰로오스(102), 스테아르산디그네소, 오파드라이화이트 03328796, 오파드라이II그린 85G41016, 오파그로스2클리어 97W9196

【성 성】 녹색의 타원형 필름코팅정

【효능 · 효과】

- 다음 질환의 위점막 병변(미란(자두름), 출혈, 발적, 부종)개선: 급성위염, 만성위염
- 비스테로이드소염진통제(NSAID) 투여로 인한 위염의 예방

【용법 · 용량】 애엽95%에탄올연조엑스로서 1회 60mg을 1일 3회 경구투여한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
유당을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactose deficiency), 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등 유전적인 문제가 있는 환자에게 이 약을 투여해서는 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
1) 혈전 환자(뇌혈전, 심근경색, 정맥혈전증 등)
2) 소비성 응고 장애 환자
3) 간장, 신장, 심장, 폐, 혈액 등에 중대한 장애를 가지고 있는 환자
4) 약물알레르기증상(발진, 발열, 가려움 등)이 있거나 병력이 있는 환자
- 이상반응
1) 국내에서 급 · 만성 위염에 대한 제3상 임상시험에 참여한 386명을 대상으로 보고된 발현부위별 이상반응은 다음과 같다.
(1) 소화기계: 때때로 구역(0.78 %), 식욕부진(0.52 %), 설사(0.52 %), 구토 (0.26 %), 속쓰림(0.26 %), 상복부통(0.26 %)이 나타났다.
(2) 정신신경계: 때때로 어지럼(0.26 %), 두통(0.26 %)이 발생하였다.
(3) 피부: 때때로 발진(0.26 %), 가려움(0.26 %)이 나타났다.
(4) 긴 및 담도계: 때때로 ALT 상승(0.26 %)이 나타났다.
2) 국내에서 비스테로이드소염진통제(NSAID) 투여로 인한 위염 예방에 대한 제3상 임상시험에 참여한 266명을 대상으로 보고된 발현부위별 이상반응은 다음과 같다. 참고로 등 임상시험은 비스테로이드소염진통제와 이 약을 동시에 투여하여 진행되었으므로 다음의 이상반응이 비스테

로이드소염진통제에 의한 것인지 이 약에 의한 것인지 확실하지 않으며, 또한, 이상반응이란 임상시험용의약품과 반드시 인과관계가 있는 것은 아니다.

- 심혈관계: 때때로 심계항진이 나타났다.
- 소화기계: 매우 자주 복부팽만, 상복부통, 속쓰림, 구역, 설사가 나타났다. 때때로 하복부통, 변비, 소화불량, 트림, 위장운동과, 위식도 역류, 구토, 허기가 나타났다.
- 간 및 담도계: 자주 ALT 증가가 나타났으며, 때때로 혈중 빌리루빈 증가가 나타났다.
- 대사 및 영양계: 때때로 식욕 증진이 나타났다.
- 신경계: 때때로 두통이 나타났다.
- 정신계: 때때로 불면이 나타났다.
- 비노생식기계: 때때로 배뇨곤란이 나타났다.
- 호흡기계: 때때로 비인두염이 나타났다.
- 기타: 때때로 혈중 LDH 증가가 나타났다.
- 국내 급 · 만성위염 환자 3,416례를 대상으로 실시한 시판 후 사용성적조사결과 이상반응은 0.18 %(6례/3,416례)가 보고되었고, 약물의 인과관계가 있는 이상반응은 0.15 %(5례/3,416례)(식욕부진, 구역, 소화불량, 복통 등이 각각 0.03 %(1례))로 보고되었다. 또한, 이 약과의 인과관계를 판단할 수 없는 것으로 보고된 예상하지 못한 이상반응은 인연 부종 0.03 %(1례)가 보고되었다.
- 국내 비스테로이드소염진통제 투여로 인한 위염의 예방 목적으로 이 약을 투여 받은 관찰영 환자 429례를 대상으로 실시한 시판 후 사용성적조사결과 이상반응은 2.10 %(9례/429례)로 보고되었고, 약물의 인과관계가 있는 이상반응은 0.93 %(4례/429례)(상복부 통증 0.70 %(3례), 구역 0.23 %(1례))로 보고되었다.

4. 일반적 주의

- 이 약은 소화성 궤양(반흔 제외)과 역류성식도염을 가진 환자와 비스테로이드소염진통제 투여에 의한 위염 및 위궤양 환자, 위절제술을 받은 병력이 있는 환자, 십이지장궤양을 합병한 환자에 사용하는 것에 대해 연구되어 있지 않다.
- 이 약은 임상시험에서 급 · 만성 위염에 최대 2주까지 투여한 경험에 있으며, 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

5. 상호작용

이 약의 약물상호작용에 대한 연구는 수행되지 않았다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 이 약은 임신중의 투여에 대한 안전성이 확인되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 이 약이 모유로 이행되는 지에 대해서는 알려진 바가 없으므로 수유부의 경우 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

7. 임상감사치의 영향

- 이 약을 1일 투여용량 180 mg으로 2주간 투여하였을 때 AST 값이 유의하게 감소하는 경향을 나타내었으나 대부분 정상 범위내에 있었고, 때때로 ALT 값이 비정상적으로 상승하는 경우와 드물게 LDH 값이 비정상적으로 상승하는 경우가 보고되었다.
- 이 약을 일일 투여용량 360 mg으로 2주간 투여하였을 때 적혈구, 헤모글로빈, 호중구, 총 단백질, ALP, AST 값이 유의하게 감소하였고, 림프구는 유의하게 증가하는 경향을 나타내었으나 대부분 정상 범위 내에 있었다.
- 국내에서 비스테로이드소염진통제에 의한 위염 예방에 대한 제3상 임상시험에서 이 약을 일일 투여용량 180 mg으로 4주간 투여하였을 때 헤모글로빈, 호중구 값이 유의하게 감소하는 경향을 나타내었고, ALT, 알부민, LDH 값은 유의하게 증가하였으나, 정상범위로 회복되었다.

8. 보관 및 취급상의 주의사항

- 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 말건하여 보관한다.
- 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의하도록 한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 30정/병, 300정/병

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【제조외의 및 판매자】 크리스탈생명과학(주) 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 70

【제조자】 (주)마더스제약 경성북도 경산시 진량읍 공단6로 24길 18

※ 본 의약품은 KGMP적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질 · 변색 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거, 구입하신 약국에서 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
※ 작성일자 이후 변경된 내용은 소비자 상담실(☎080-001-0795) 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
※ 부작용 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(14-3330)



크리스탈생명과학

개정년월일: 2022년 02월 17일
05358-04