



효과 빠른 변비약 이지굿^정

【원료약품 및 그 분량】 이 약 1정 중

비사코딜(BP)	5mg
도큐세이트나트륨(USP)	10mg
센노사이드칼슘(별규)	5mg (센노사이드 A와 B로서 1,97mg)
*참가제(타르색소) : 황색203호 알루미늄레이크, 청색2호 알루미늄레이크, 청색 1호 알루미늄레이크	

【성상】 녹색의 원형 장용성 필름코팅정

【효능·효과】

- 변비
- 변비에 수반하는 다음 증상의 완화: 치질, 복부팽만, 장내이상발효, 머리무거움, 인연홍조, 식욕부진(식욕감퇴)

【용법·용량】

성인 및 15세 이상 : 1회 1~3정을 1일 1회, 취침 전(또는 공복시) 복용한다. 단, 처음에는 최소량을 복용하고, 배변의 상태를 지켜보면서 조금씩 증량(양을늘림) 또는 감량(양을줄임)한다.

【사용상 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 급성 복부질환(중수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자 2) 장폐색(참지막염) 환자 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것. 1) 다른 하제(설사약) 2) 제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내 3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것. 1) 수유중 경우 이 약 복용을 중지하거나, 복용 시에는 수유를 피한다. 2) 과량 복용 4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 오시의 치료와 받고 있는 사람 2) 임신부나 임신의 가능성이 있는 사람 3) 본인이나 가족이 알레르기질환인 경우 4) 약에 의한 알레르기 이력이 있는 경우 5) 다음 증상이 있는 경우: 심한 복통(배앓), 구역, 구토 6) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 7) 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람 8) 이 약은 황색5호(선셋 옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. 5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 복용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우 2) 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감, 경련이 일어날 경우 3) 1주정도 복용해도 증상이 개선되지 않는 경우 4) 설사가 지속, 증강되는 경우 6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항. 1) 정해진 용법용량을 준수한다. 2) 이 약은 장용성이므로, 씹거나, 부수어 먹지 않고 그대로 물과 함께 복용한다. 3) 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사한다. 7. 저장상의 주의사항. 1) 직사광선을 피하고, 습기가 적은 서늘한 곳에 보관한다. 2) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 3) 다른 용기에 보관하지 않는다(오용(잘못사용)의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있다). 4) 사용기간이 지난 경우 복용하지 않는다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 20정

- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품이며 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의해 보상받을 수 있습니다.
만약, 구입 시 사용유기기간이 경과되었거나 변질변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- * 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.
- * 가장 최근 개정된 제품설명서의 내용 등 본 제품에 대한 정보는 식약처관리약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 또는 당사 홈페이지(<http://www.dkpharm.co.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- * 제품에 관한 의문사항은 동국제약(주) 소비자상담실(☎080-777-5678 : 수신자 요금부담로 문의주십시오).

설명서 최종개정날월일 : 2017.03.08

제조원

동국제약

dongk.co.kr
02-2626-2000

충청북도 진천로 광혜원동 용산2길 33-19