

신경 비타민을 함유한 근육경면 및 혈액순환 개선제

[유효성분] 1캡슐(1.615 mg)중

• 토코페롤(비타민E)(TP) (비타민E로서 500μg)	500 mg	• 벤조산(벤조산) (다량인산으로서 14.46mg)	20 mg
• 아스코르브산(비타민C) (아스코르브산으로서 150.78mg)	250 mg	• 글리옥살(비타민B) (비타민B로서 10mg)	10 mg
• 티라민(티라민)(TP)	50 mg	• 살리실산(아스피린) (아스피린으로서 50μg)	92.99 mg
• 티라민(티라민)(TP)	30 mg		

• 다음 경우의 비타민 B₁, B₆의 보충

- [illegible]

• **첨가물** : 다량요소인 칼슘 40%, 황 5%, 철 0.5%, • **기타** : 17.4% (물기물, 황산, 레시틴, 폴리소르베이트 80, 술폰사염화물, 농축리사틴, 산화티타늄)

[용법·용량] 만 12세 이상 및 성인 1일 2회, 회 1캡슐 복용	[성상] 회하의 유상 내용물을 함유한 일일성의 정장형 연질캡슐
[포장단위] 60캡슐(10캡슐xPTP X 6), 120캡슐(10캡슐xPTP X 12)	[저장방법] 기밀유지, 실온(5~30℃) 보관
[사용기간] 제조일로부터 24개월	[제 조] 코스메스바이오(주) (충청북도 제천시 바이오펀드3로 30)
[판매처] 영진약품(주) (경기도 화성시 남양읍 무로로 66)	[소비자상담실] 080-990-6200 (반드시 코호넷 : 구안락)

- 본 약의약품은 의학적 용도만을 위한 제약품입니다. 구입 시 사용용량이 기재되었거나, 전문 인력 또는 오손된 제품을 구입자를 통해 교환하여드립니다.
- 본 제품은 공중위생관리법상 소독제 분류에 해당하여, 청결한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- 의약품에 사용하기 전에 청포문서를 주의깊게 읽어와야 하며, 청포문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 소독제 잔액이 1/3 이하에 도달하였을 때, 버섯, 고추, 양파, 오이와 같은 채소류는 10분 이상 세척 후 섭취할 수 있습니다.

1. 다음과 같은 사람은 이약을 복용하지 말 것
특히 약 및 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
2. 한 12개월 미만의 유아
3. 심한 중상 및 신부전 환자
4. 대두유에 과민반응이 있을 경우 병력이 있는 환자
5. 두드러기, 발진에 과민반응이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 약을 복용하지 말 것
- ① 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- ② 과산화물
3. 다음과 같은 사별증상(위 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것)
- ① 의사의 처방을 받고 있는 환자
- ② 일부 열 및 신진대사 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- ③ 소화불량, 만성구강염, 국한성 피부 부위에 나타나는 파장성 등 의 이상질환 환자
- ④ 심장-순환기계 기능 장애 환자
- ⑤ 신장장애 환자
- ⑥ 재단백증 환자
- 기타부
- ⑦ 고지혈증, 당뇨병성 고지혈증 및 혈당증 등 저지혈사 이상 환자 또는 지질산 유래를 신중히 투여해야 하는 환자
- ⑧ 위 약은 황색~노란색으로 FCF, Sunset Yellow FCF를 함유하고 있으므로 이 성분은 감광제나 일광보호기 병행이 있는 용액에는 사용해서는 안 된다

- 다 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중지하고 의사, 치과사나 약사와 상의할 것
 성당 시가하는 한이 혈투로음을 소지할 것
 이 약의 투여에 의해서 다음의 증상이 있을 경우 : 피부발진, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 붉은 번, 붉은 분진, 부종속
 (심장정맥경화), 홍채염(눈) 등, 피부 및 항소시에서 열, 탈모, 고혈압
 다 이 약의 투여후에 설사가 발생할 때 "탈수"가 아닌 장기간 투여를 계속할 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다
 다 코에 쓰임새를 포함한 경구용 피임약을 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자나 비만인들을 복용할 경우 혈전증의 위험
 을 높일 수 있다.
 다 지체하루를 일 500 mg - 2 g로 용량으로 정해진 복용하면 간기능 이상 또는 신경병 증상(neuropathy : 말초신경병)
 등의 장애가 올 수 발생한다(대부분이 가역적).
 다 대변물에서 인산, 구리, 동 등의 미량중금속, 니트로페놀류, 술알코올, 부동붕소 등의 증상이 나타날 수 있다.
 다 알콜도스메타제, 로피라미드와 병용하며 시 곁질감증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
 다 구취악으로 부작용을 한 경우
 다 임질병으로 감염되어도 주사의 개시나 연오 연오

5. 국가 이익의 보호 시 주의사항
가. 정당한 공익·상항을 잘 지킴
나. 국적, 출자 등 탄소를 일으키는 자는 복종권, 복종권항쟁은 피함
다. 자국민보다도 특별한 위위나 애사는 한자에서 이익을 추구할 때 행정자율권을 점검할 것을 권한다. 이걸 권할 때 특히 자국민 체포권이나 징수권보다도 먼저 이익의 보호를 주장할 수 있다. 한자에서 징수를 자결권을 통사해 후이하고 있으면 이익 충돌의 가능성은 높아져 있는 자결의 양을 고려하여 그 자결의 후이권을 검토해야 한다.

- ① 어민들의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
② 직사광선을 피하고 뒤편에 있는 한 손가락 작은 서늘한 곳에 밀착하여 보관할 것
③ 오유(오염)를 사들임 않고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것