


효모·효소·유산균



원기소플러스정

■ 소화 ■ 정장 ■ 변비

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

디아스타제·프로테아제·셀룰라제2000IV(KP)..... 20mg
(전분당화력 (pH 4.5) 278단위, 단백소화력 (pH 3.0) 170단위, 섬유소
당화력(pH 4.5) 2단위)
리파제 II (KP) 5mg
(지방소화력 (pH 6.0) 30~37.5단위)
락토바실러스 스포로게네스균(별규) 10mg
(2×10^7 개)
건조효모(KP) 92.25mg
동물유래성분 : 유당수화물(소, 우유)

【효능 및 효과】

소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인
한 위부팽만감, 정장, 묽은 변, 변비, 복부팽만감, 장내이상발효, 위부
팽만감, 구역, 구토

【용법 및 용량】

- 만 15세 이상 : 1회 9정
 - 만 11세 이상 ~ 만 15세 미만 : 1회 6정
 - 만 8세 이상 ~ 만 11세 미만 : 1회 4.5정
 - 만 5세 이상 ~ 만 8세 미만 : 1회 3정
 - 만 3세 이상 ~ 만 5세 미만 : 1회 2.25정
- 1일 3회 입안에서 녹이거나 씹어서 복용한다.

【포장단위】 400정/병

【성 상】 담황갈색의 원형 chewable 정

【저장방법】 기밀용기, 실온($1 \sim 30^{\circ}\text{C}$)보관

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance),
Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스
흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자
에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 3) 의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 1개월정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 투여할 것

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관
할 것
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

※기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오.

※의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기
한이 경과 되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입
한 곳에서 교환해 드립니다.

※본 표시사항은 최신 정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고
있으므로 사용전에 주의깊게 읽어 주시고, 의약품과 함께 보관하여 주
십시오.

※의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※표시되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안
전처에 전달하십시오.

【고객상담실】 02-533-2992

【제조원】 대한뉴팜(주) <http://www.dhnp.co.kr>
경기도 화성시 향남읍 제약공단 1길 66

【판매원】 서울약품(주) <http://www.seoulpharm.co.kr>
서울특별시 강동구 올림픽로 738

작성년월일 : 2017.03.22
3023200-00