

활성비타민이 함유된 종합영양제 비타콤보정

우수의약품제조관리기준
KGMP적격지정업체
일반의약품
분류번호 : 319

■ 성분·함량 : 1정 중

넌포티아민(KP)	50mg
(리비타민)사염으로서 36.5mg)	
리보글라틴(KP)	50mg
니코틴산아디노스(KP)	50mg
판토텐산칼슘(KP)	50mg
피로 독신염산염(KP)	50mg
폴산(KP)	200μg
클린디리드산염(USP)	50mg
아노시톨(KP)	50mg
d-비오틴(USP)	250μg
산화아연(KP)	18.7mg
(아연)으로서 15mg)	
직다용아스코르브산97%(결규)	100mg
(아스코르브산)으로서 97mg)	
시아노코발라민1000배산(KP)	50mg
(시아노코발라민)으로서 50μg)	
토쿠페롤세데이트2배산(KP)	20mg
(비타민E)로서 10IU)	
우르소데옥시콜산(KP)	10mg
셀레늄화유건조효모(KP)	25mg
(셀레늄)으로서 13.5μg)	
(에르고칼시페롤)과립(말규)	0.053mg
(치타민D)로서 50IU)	
푸로실티아민(KP)	5mg
천가제(타르소스) : 황색호 일루미네이크, 황색5호 일루미네이크, 적색40호	

■ 성분 : 갈색의 장방형 필름코팅정

■ 효능·효과

1. 다음 경우의 비타민 (B1, B2, B6, C, D, E) 의 보급

- 육체피로
- 임신 · 수유기
- 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력회복
- 발육기
- 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 효과는 다음과 같다.

- 다음 증상의 원호 : 신경통, 근육통, 관절통(요(하)리, 등, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 각기
- 늑의 피로

3. 아연의 보급

■ 용법·용량

1. 18세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1 ~ 2정 복용하십시오.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia) : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태 환자, 우육술증(sarcodosis) : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환, 신장질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 장막이
- 4) 신장(콩팥)장애 환자
- 5) 이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당불내증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 햇빛을 많이 보고 중상적인 식사를 하는 경우
- 3) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산이 배설되는 상태)
- 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 비타민 D는 모유로 분비되어 산생아에게 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)을 일으킬 수 있습니다.
- 5) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분)에 나타나는대장염 등의 위장질환 환자
- 6) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
- 7) 신장(콩팥)장애 환자
- 8) 저단백혈증 환자
- 9) 통풍환자 또는 신장(콩팥)장애 환자
- 10) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
- 11) 이 약은 황색5호(산색)로 FCF, Sunset Yellow FCF를 함유하고 있으므로 이 성분과 과민하게나 알러르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.

상임시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 붉은 변, 구내염(입안염), 피부염, 딸 · 호흡기 약취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 성부(배부)동통, 저혈압, 폐부종(부기)
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생가 : 예정보다 빨라지거나 많이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구(먹는, 복용하는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 5) 피로독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 6) 폴산이 부족한 환자에서 비타민 B12를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성 위양을 촉진시키고 당내성(포도당내성)손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간소성을 일으킬 수 있습니다.
- 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 그나트륨결핍, 올혈신부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 9) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))두어시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 10) 우발적으로 과량복용 한 경우
① 1개월 정도 복용하여도 증상이 개선이 없을 경우.

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지켜십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여하십시오.
- 3) 각종 요감시에서 혈당의 감시를 병행할 수 있습니다.
- 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
- 5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(15~30℃)보관

■ 사용기간 : 제조일로부터 36개월

■ 포장단위 : 60정, 120정(60정×2)

■ 제조회사 : (주)테라젠이텍스

경기도 안산시 단원구 산단로68번길 58

지조자 : 0 래지(주)

경기도 안산시 공단로 104

■ 판매처 : 광동제약 / 경기도 평택시 산단로 114

THERAGEN ETEX

MIRAE PHARM. CO.,LTD.

※ 의약품은 사용하기 전에 첨부문서(설명서)를 주의 깊게 읽어야 하며, 이 첨부문서(설명서)를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하고, 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP) 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다.

※ 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질 · 변색 · 오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회(소보자 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품 판매업자를 통해 교환 받을 수 있습니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품사전(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하십시오.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국약물관리원(의약품안전관리원)에 알려주십시오.

※ 이 첨부문서의 개정일 이후 변경된 내용은 02)3463-7111이나 www.etexpharm.com 에서 확인할 수 있습니다.

개정일 : 2017. 04. 05
P010257-170405-00