

※ 의약품 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고시고, 의약품과 함께 보관하십시오.

의약품
분류번호:321
KOMP적격업체

파워본엔킹

연질캡슐


1일 1회하루 한번 마그네슘, 흡수율을 높이는 비타민D 함유 칼슘제

골격(뼈),치아(이)의 발육불량

노년기 임신·수유기의 비타민D 공급보급

성장발육에 도움

구루병 예방



【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

글루콘산칼슘수화물(JP)	170.0 mg
(칼슘으로서 15.2mg)	
인산수소칼슘수화물(USP)	590.0 mg
(칼슘으로서 137.41mg, 인으로서 106.19mg)	
농축콜레칼시페롤(유상(BP)	1.0 mg
(비타민D로서 1,000 IU)	
산화마그네슘(KP)	20.0 mg
(마그네슘으로서 12.06mg)	
첨가제(동물유래) : 젤라틴(기원동물 : 소, 사용부위 : 가죽)	
첨가제(타르색소) : 적색40호, 황색5호, 청색1호	

【성상】 유백색의 유상 내용물을 함유한 암갈색의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 D 의 보급
 - 임신·수유기, 발육기, 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 뼈, 이의 발육불량 - 구루병의 예방

【용법·용량】 만 12세 이상 및 성인 1일 1회, 1회 1캡슐 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 않습니다.
 - 1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염종질환), 신장질환 환자
 - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 4) 신장(콩팥)결석 환자
 - 5) 심한 증상의 신부전 환자
 - 6) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 7) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 않습니다.
 - 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 마취약, 유아비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
 - 3) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 4) 신장(콩팥)장애 환자
 - 5) 지단백혈증 환자
 - 6) 감심배당체를 투여 중인 환자
 - 7) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
 - 8) 임부
 - 9) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
 - 10) 이 약은 황색5호(선색제로 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여 합니다.
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
 - 2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
 - 3) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 골석증이 나타날 수 있습니다.
 - 4) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께복용)투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
 - 5) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
 - 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체내배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.
6. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관하십시오.
 - 3) 오염(질똥 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 60캡슐, 120캡슐

【제조회사】 에이프로젠제약(주) / 경기도 화성시 양감면 두마리길 16

【제조자】 코스맥스바이오(주) / 충북 제천시 바이오밸리3로 30

【판매자】 (주)대웅생명과학 / 서울시 송파구 삼전로 42

* 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.

* 이 첨부문서 작성일자(2017년 06월 20일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인약도서관(<http://drug.mfds.go.kr/>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.

* 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

※ 소비자 상담실 (02)561-4011

첨부문서 최종 개정연월일 : 2017.06.20

1706-00