

피나시딜정 5mg

(피나스테리드)

【화려약품 및 그 분량】1정 중

피나스테리드 (LSP) 5mg

*참가제(타르박스) 청색조 알루미네레이크

【성 상】 청색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

양성전립선비대증:

- 양성전립선비대증 증상의 개선
- 비후된 전립선의 퇴행 및 요류 개선
- 급성 요폐와 발생빈도 감소
- 전립선경요도절제술(Transurethral Resection of the Prostate) 및 전립선절제술 등을 포함한 수술의 필요성 감소

【용법·용량】 피나스테리드로서 1일 1회 5mg을 식사와 관계없이 경구투여한다.

- 복용 시 증상이 개선되더라도 최소 6개월간의 치료가 필요하다.
- 신부전 환자: 약물동태학적으로 볼 때 이 약의 투여 시 어떤 변화도 없었으므로 여러 종류의 신부전 환자(크레아티닌청소율: 9.0mL/min)에게 용량 조절할 필요가 없다.
- 고령자: 70세 이상 고령자에게 있어 이 약의 배설이 약간 감소되기는 하나 용량을 조절할 필요는 없다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

- 1) 이 약은 소아 또는 여성에게 투여하지 않는다.
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성은 피나스테리드의 흡수 및 그 이후 남성 태아에 대한 잠재적 위험의 가능성이 있으므로 이 약의 부사지거나 개진 조차를 만져서는 안 된다. 이 약은 코티드여 있기 때문에, 깨지거나 부사하지 않았다면 정상적인 취급 시에는 활성 성분과의 접촉을 방지할 수 있다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
- 2) 여성 또는 소아
- 3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 4) 이 약은 용량을 함유하고 있으므로 갈락토스 불내증(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(apo lactase deficiency) 또는 모도당-갈락토스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

간기능에 이상이 있는 환자

4. 이상반응

- 1) 이 약은 내약성이 우수하고 이상반응은 일반적으로 경미하고 일시적이다.
- 2) 위국의 임상 4년간의 위약대조 임상시험(PLESS, Proscar Long-Term Efficacy and Safety Study)에서 이 약으로 치료를 받은 1524명의 환자와 위약 치료를 받은 1569명의 환자에 대한 4년에 걸친 안전성 평가를 실시하였다. 이 약으로 치료한 37.4%57명의 환자와 위약으로 치료한 2.4%32명의 환자가 성기능관련 이상반응으로 치료를 중단하였으며, 가장 빈번하게 보고된 이상반응은 성기능관련 이상반응이었다. 4년간의 임상시험에서 위약보다 높은 빈도로 발현하였고 이 약에서의 발현율이 1% 이상이었으며 임상시험연구자에 의해 악화과 관련되어 있을 가능성이 있거나, 아마도 관련되어 있거나, 분명히 관련되어 있다고 간주된 이상반응은 다음 표과 같다. 임상시험 2~4년에서 는 투여기간 별기부전 성욕감퇴 사정장애 발현율에 유의한 차이가 없었다.

표. 약물관련 이상반응	1년 (%)		2~4년 (%)	
	피나스테리드 5mg (n=1524)	위약 (n=1569)	피나스테리드 5mg (n=1524)	위약 (n=1569)
발기부전	81	37	51	51
성욕감퇴	6.4	3.4	2.6	2.6
사정장애/감소	3.7	0.8	15	0.5

3) 장기사용에 관한 자료

3,047명의 환자를 대상으로 4~8년간 수행한 위약 및 양성대조 임상시험에서, 이 약 5mg을 투여한 투여군에서 42건의 유방암이 발생하였고 위약군 및 양성대조군에서는 발생하지 않았다. 별도의 3,040명의 환자를 대상으로 4년간 수행한 위약대조 임상시험에서 위약군에서 22건의 유방암이 발생하였고 이 약 5mg 투여군에서는 발생하지 않았다. 18,882명의 남성이 참여한 7년간의 위약대조 양성시험(Prostate Cancer Prevention Trial, PCPT)에서 이 약 투여군 및 위약군에서 각각 1건의 유방암이 발생하였다. 남성 유방암에 대한 시판 후 보고가 있다. 이 약의 장기간 투여와 남성유방 신생물간의 관련성은 현재 알려져 있지 않다.

PCPT 임상시험은 직장수지검사에서 정상이고 전립선 특이항원(Prostate Specific Antigen, PSA) 수치가 <3.0ng/mL 인 55세 이상 18,882명의 남성이 참여한 7년간의 무작위, 이중맹검, 위약대조 임상시험이었다. 남성들은 이 약 5mg 또는 위약을 1일 1회 투여받았다. 환자들은 매해 직장수지검사 및 PSA를 평가받았으며, 생체조직검사는 PSA가 상승되거나 직장수지검사에서 비정상적으로 나온 경우와 임상시험 마지막에 시행하였다. 위약을 투여받은 남성(1%)에 비해 이 약을 투여받은 남성(1.8%)에서 Gleason 등급 8~10의 전립선암의 발생빈도가 더 높았다. 다른 5α-환원효소 억제제(테스타스테리드)에 대한 4년간의 위약대조 임상시험에서도 Gleason등급 8~10의 전립선암에 대한 유사한 결과가 관찰되었다(테스타스테리드 vs. 위약 0.5%). 이 약 5mg을 투여받은 전립선암 환자에서의 임상적 유익성은 입증되지 않았다.

4) 위국의 시판 후 조사

- 1) 약 그리고/또는 이 약 저용량에서 다음과 같은 이상반응이 추가로 보고되었다. 이 이상반응은 불특정 인구집단에서 자발적으로 보고된 것이기 때문에, 발생빈도를 신뢰성 있게 예측하거나 약 불내증과 연관관계를 확립하는 것은 일반적으로 불가능하다.
- 2) 면역계: 가려움, 두드러기 및 혈관부종(종독, 혀, 목구멍 및 얼굴의 충창을 포함)과 같은 과민반응
- 3) 정신계: 우울증, 투여 중단 후 지속되는 성욕감퇴
- 4) 생식계 및 유방: 고휘통: 투여 중단 후 지속되는 성기능 장애/발기부전, 사정장애: 남성 불임 그리고/또는 정액의 질 저하, 피나스테리드 투여 중단 후 정액의 질 정상화 혹은 개선이 보고되었다: 남성 유방암
- 5) 위장장애(속쓰림, 어지럼, 두통
- 6) 국내의 시판 후 조사

- 6년동안 3,675명을 대상으로 실시한 시판 후 조사 결과 이상반응의 발현빈도율은 인과관계와 상관없이 107명에서 12.4%(3.3%)이 보고되었. 이 중 이 약과 인과관계가 있을 수 있는 것으로 평가된 것은 위장장애(속쓰림, 발기부전, 성욕감퇴, 사정장애(정액량 감소), 발진, 가려움, 과민반응, 두통, 어지럼)이었다.
- 1) 소화기계: 소화불량, 변비, 위장장애(속쓰림, 목이름 등 7건(1.9%)
- 2) 비뇨생식기계: 발기부전, 성욕감퇴, 사정장애(정액량 감소) 등 102건(2.78%)
- 3) 피부: 발진, 가려움증 등 22건(0.05%)
- 4) 전신: 암상저림, 과민반응, 두통, 권태감 등 62건(1.6%)
- 5) 기타: 어지럼, 중이염, 간기능 이상 등 72건(1.9%)

5. 일반적 주의

- 1) 이 약에 의한 의효는 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 2) 의사는 이 약으로 치료를 시작하기에 앞서 간염, 전립선암, 혈청 질원, 저장정 방광 또는 양성전립선비대증(DP)과 유사한 다른 신장질환을 확인하기 위한 적절한 평가를 실시하여 하며 환자에게 제품설명서를 읽어보도록 하고 치료용 경신할 때마다 한번 더 읽어보도록 하여 환자들이 이 약과 관련된 최신 정보를 인식하도록 한다.
- 3) 의사는 이 약으로 치료하는 동안 일부 환자에서 사정장애가 감소할 수 있다는 것을 환자에게 알려야 한다. 이런 사정장애 감소가 정상적인 성기능을 방해하는 것으로 보아지는 않지만 이 약으로 치료를 받는 환자에게 발기부전과 성욕감퇴가 발생할 수 있다.
- 4) 직장수지검사에서 정상이고 PSA수치가 <3.0ng/mL 인 55세 이상의 남성을 대상으로 7년간 이 약 5mg을 복용한 PCPT 임상시험에서 Gleason 등급 8~10의 전립선암 위험성이 증가되었다(피나스테리드 1.8% vs. 위약 1%).

다른 5α-환원효소 억제제(테스타스테리드)와 테스타스테리드 vs. 0.5% 위약을 대한 4년간의 위약대조 임상시험에서도 비슷한 결과가 관찰되었다. 5α-환원효소 억제제는 고등급 전립선암 발전의 위험성을 증가시킬 수 있으나, 전립선 부피를 감소시키기 위한 5α-환원효소 억제제 효과 때문인지 이러한 연구들의 결과에 영향을 미치는 다른 요인들 때문인지는 확립되지 않았다.

6. 상호작용

- 1) 이 약과 관련된 약물상호작용은 알려진 바 없다.
- 2) 이 약은 CYP4C0 관련 약물대사효소계에는 영향을 끼치지 않으므로 이러한 기전으로 대사되는 약물인 프로프라놀롤, 디곡신, 글리리데드, 와르파린, 데오말린, 안티피린 등과의 상호작용은 나타나지 않는다.
- 3) ACE억제제, 알파1차단제, 베타차단제, 칼슘채널차단제, 심장정지장신제, 이노제, H2결합제, HMG-CoA환원효소억제제, 테스타스테리드성소염진통제(NSAID), 퀴놀론제, 벤조다이제핀 등과의 병용투여 시 임상적으로 유의한 이상반응은 나타나지 않는다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 이 약은 임부나 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 투여를 금한다. 이 약을 임부나 복용 시, 남성태아)의 외부생식기의 비정상성을 초래할 수 있다(11 항5α-환원효소 억제제가 테스토테스테론이 디하이드로테스토스테론으로 전환되는 것을 저해한다). 만일 이 약을 임신 중에 복용했거나 또는 이 약을 복용하는 도중에 임신이 되면 임신여성에게 남성태아에 대한 잠재적 위험성을 알려주어야 한다. 양친 컷트를 대상으로 한 동물실험에서 임신 중에 자궁량의 이 약을 투여하였을 때 수컷 새끼의 외부부기형을 초래하였다.
- 2) 이 약의 부사진 조치가 흡수되어 임부의 남성태아: 외부생식기에 비정상성을 초래할 수 있으므로 이 약의 부사진 조치는 임부나 임신했을 가능성이 있는 여성이 취급해서는 안 된다. 그러나, 이 약은 깨어지거나 부사하지 않았거나 코팅이 되어 있어 정상적인 취급에는 주성분에 노출되지 않는다.
- 3) 임상시험에서 이 약 5mg/day를 6~24주 동안 복용한 피험자의 정액에서 소량의 피나스테리드가 회수되었다. 임신한 여성에게 이 약으로 치료를 받은 환자의 정액으로 노출되는 피나스테리드 농도는 meaus 원성이 동물실험에서 보고된 태아의 발육 기형에 대한 no-effect level에 해당하는 피나스테리드의 농도보다 50~100배 낮은 용량이다.
- 4) 이 약의 모유로의 이행여부는 확실하지 않으며 수유부에는 투여하지 않는다.

8. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 소아에게는 투여할 수 없다.

9. 고령자에 대한 투여

위국에서 위약대조 임상시험(PLESS)에 참가한 피험자 중 65세 이상은 1,480명이었고 75세 이상은 1,052명이었다. 고령자와 젊은 피험자간의 안전성상 유효성에 유의한 차이가 관찰되지 않았으며, 다른 임상적 장형에서도 고령자와 젊은 환자들의 반응에 차이가 없었다. 고령자에 대한 용량조절이 필요하지 않다.

10. 임상검사전치에의 영향

- 1) 이 약으로 치료를 받은 전립선암 환자에서 임상적 효능은 입증되지 않고 있다. 대조 임상시험에서 연속적인 전립선특이항원(PSA) 수치와 전립선 생검으로 PSA가 증가된 양성전립선비대증 환자를 모니터링 하였다. 이러한 DP-임상시험에서 이 약은 전립선암 진단 비율을 변화시키지 않는 것으로 나타났다. 또한, 전립선암의 잠재적인 발병률은 이 약으로 치료를 받은 환자 또는 위약 치료를 받은 환자에서 유의한 차이가 없었다.
- 2) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 3) 의사는 이 약으로 치료를 받는 환자의 자측적인 PSA수치 증가는 이 약의 치료에 대한 비순응 문제를 고려하는 것을 비롯하여 주의깊게 평가해야 한다.
- 4) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 5) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 6) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 7) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 8) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 9) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 10) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 11) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 12) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 13) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 14) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 15) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 16) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 17) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 18) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 19) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 20) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 21) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 22) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 23) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 24) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 25) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 26) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 27) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 28) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 29) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 30) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 31) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 32) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 33) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 34) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 35) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 36) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 37) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 38) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 39) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 40) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 41) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 42) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 43) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 44) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 45) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 46) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 47) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 48) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 49) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 50) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 51) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 52) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 53) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 54) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 55) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 56) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 57) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 58) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 59) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 60) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 61) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 62) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 63) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 64) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 65) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 66) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 67) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 68) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 69) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 70) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 71) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 72) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 73) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 74) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 75) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 76) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 77) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 78) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 79) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 80) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 81) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 82) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 83) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 84) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 85) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 86) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 87) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 88) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 89) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 90) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 91) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 92) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 93) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 94) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 95) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 96) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 97) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 98) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 99) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 100) 위국에서는 사실의 유익성은 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 진린루를 가지는 환자나 심하게 욕속이 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.

돈 병을 인하여 대한 내와 FS-9의 반응을 변화시키지 않는다. 이는 사싱하부-뇌하수체-고환 축이 영향받지 않음을 시사한다. 건강한 남성 자립자에서 정액 파라미터를 평가하기 위한 24주간의 이 약 치료는 정액 농도, 운동성, 형태, 5-에 임상적으로 유의한 영향을 주지 않았다. 사정시 전체 정액량이 감소되었고 0.6mL (22%)의 평균 사정량 감소가 관찰되었다. 이들 파라미터는 정상 수준 범위 안에 있었으며 치료를 중단하기 소멸되기 사정하여 평균 84주후 기저 상태로 회복되었다.

11. 과량투여시의 처치

- 1) 이 약의 과다 복용시에는 특별한 치료법은 없다.
- 2) 이 약을 400mg까지 단회투여하거나 3개월간 1일 80mg까지 반복 투여한 환자에서 이상반응이 나타나지 않았다.

12. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

13. 약역동동등성시험 정보

시험약 피나스테리드(50mg)0.01리터(제이더블유중의제약주)와 대조약 프로스카정(피나스테리드)(한글약품사(유))를 2×2 교차시험으로 각 1정씩 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구투여하여 27명의 활동 피나스테리드를 측정된 결과, 비교평가항목치 (AUC, C_{max})를 로그변환하여 통계 처리하였을 때, 평균치 차의 90%신뢰구간이 log₁₀에서 log₁₀ 25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

피나스테리드 5mg		비교평가항목		참고평가항목	
구분		AUC ₀₋₁₂ (ng·hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	프로스카정 (한글약품사(유))	237.34±59.40	38.39±7.26	1.59±0.83	4.74±1.09
	피나스테리드(50mg)0.01리터 (제이더블유중의제약주)	234.60±65.21	40.44±8.23	1.72±1.08	4.65±1.31
90% 신뢰구간 (기초log0.8~log1.25)		log ₁₀ 9.16~1.06/8	log ₁₀ 9.84~1.03/9	-	-

(AUC, C_{max}, t_{1/2}, T_{max}): 평균값±표준편차, n=27
AUC: 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 까지의 혈중농도-시간곡선하면적
C_{max}: 최고혈중농도
T_{max}: 최고혈중농도 도달시간
t_{1/2}: 말단 소실 반감기
* 비교평가항목치(를 로그변환한 평균치 차의 90% 신뢰구간
주: 이 약은 제이더블유중의제약주 피나스테리드(50mg)0.01리터와 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 전 공정을 제이더블유중의제약주에 위탁 제조하였음.

【보통양자】 30정(10정/PTP×3)

【저장방법】 실온(5~30℃)보관, 차광기밀용기

- * 본 약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며 공정거래위원회에서 소비자분쟁 해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. 만약 구입시 사용유효기간이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- * 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 약품명과 함께 보관하십시오.
- * 가장 최근 개정된 제품설명서의 내용 등 본 제품에