

이명(귀울림)증 노이제로정 Tinnitus

[원료약품 및 그 분량] 1정(500mg) 중

아미노벤조산에틸(KP)	30mg
카페인수화물(KP)	20mg
(카페인으로서 18.3mg)	
클로르페니라민말레산염(KP)	2mg
니코틴산아미드(KP)	20mg
파파베린염산염(USP)	5mg
리보플라빈(KP)	1mg
티아민염산염(KP)	10mg
노회(생규)	2mg

[성상] 고동색의 타원형 필름코팅정

[효능·효과] 이명(귀울림)증

[용법·용량] 1회 2~3정, 1일 3회 식사 후 물과 함께 복용한다. 15세 미만 소아에게는 복용하지 말 것.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것 1) 15세 미만의 소아에게는 복용하지 말 것.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
 - 멀미약, 감기약, 해열진통제, 진정제, 진해거담제(기침가래약), 항히스타민제 성분의 내복약 등(비염(코염) 또는 알레르기용 약 등)을 복용하고 있는 사람
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것
 - 이 약을 복용 후 차량 또는 기계 장치의 운전 조작을 하지 않는다.(졸음이 나타날 수 있다.)
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사 또는 약사와 상의할 것.
 - 지금까지 다른 항히스타민제, 멀미약, 감기약, 진해거담제(기침가래약)에 의한 알레르기 증상(예 : 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움증 등)이 일어난 경향이 있는 환자 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 3) 전립선(전립샘)비대증 등 배뇨(소변을 누) 장애 환자 4) 의사의 치료를 받고 있는 사람 5) 다음의 진단을 받았던 적이 있는 사람 : 녹내장, 심장질환 6) 약물 등에 의한 천식을 일으킨 적이 있는 사람
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고, 의사, 치과의사 또는 약사와 상의할 것
 - 이 약 복용 후 알레르기 증상(예, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등), 배뇨(소변을 누)곤란, 혈압상승, 입마름, 변비, 설사 등이 나타나는 경우 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것 2) 드물게 다음과 같은 심각한 증상이 일어날 수 있다. 이러한 경우에는 즉시 의사의 진단을 받을 것

이상반응	증상
재생불량성 빈혈	파란명, 코피, 잇몸출혈, 발열, 피부와 점막이 창백해짐, 피로감, 가슴의 두근거림, 호흡곤란, 빈혈, 혈뇨 등이 나타난다.
무과립구증	갑작스러운 고열, 오한(춥고 떨리는 증상), 인후(목구멍)통 등이 나타난다.

6. 기타 이약의 복용 시 주의할 사항.

- 정해진 용법,용량을 잘 지킬 것 2) 다른 약물과 동시에 복용하지 말 것 3) 수일간 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 사용을 중지하고 의사, 치과의사 또는 약사와 상의할 것 4) 장기 계속하여 복용하지 말 것

7. 저장상의 주의사항

- 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 직사광선을 피하고 습기가 적은 서늘한 장소에 보관할 것 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 품질을 보존하기 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[저장방법] 차광밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 90정

[사용기간] 제조일로부터 32개월

※본 의약품은 우수약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 지났거나 변질·변태·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
 ※어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
 ※사용기한이 지난 의약품은 복용하지 마십시오.
 ※이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
 ※자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
 ※부작용 보고 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

NZR01-E01-00

첨부문서 작성 연월일 : 2017. 04. 04