

밀크시슬 고향량 함유

리베마린350 연질캡슐 (밀크시슬엑스)

간 해독작용 성분 생성 | 간세포막 보호작용
만성간염 | 간경변

일반의약품
분류번호 간장질환용제(C3910)

본 약은 사용하기 전에 본 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 본 첨부문서를 본 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

- 유효성분: 밀크시슬엑스(생규) 350mg
- 첨가제(타르색소): 청색1호, 황색5호, 황색203호
- 기타첨가제: 콩기름, 경화유, 백납, 레시틴, 숙신산젤라틴, 농글리세린, 소르비톨액(비결정성), 에틸바닐린, 산화티탄, 카르나우바납, 중쇄트라이글리세리드

[성상] 황갈색의 유상 내용물을 함유한 녹색의 장방형 연질캡슐제

[효능·효과] 다음 질환의 보조치료: 독성간질환, 만성간염, 간경변

[용법·용량] 성인 1일 1회, 1회 1캡슐 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 심한 담도(담관, 쓸개길) 폐쇄환자
- 2) 이 약의 과민증 환자
- 3) 12세 이하의 소아
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 임신, 수유부
- 2) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 3) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것, 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 드물게 위통 또는 설사
- 2) 알레르기 반응

4. 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 지킬 것
- 2) 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의 할 것
- 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의 할 것
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈당지질치를 점검 할 것을 권장 한다. 이 점검을 통해 지방의 체내배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이약의 투여를 적절히 조절 한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여 받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야한다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것
- 3) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

※ 부작용 보고: 한국의약품안전관리원(1644-6223)

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 [사용기간] 제조일로부터 24개월

[포장단위] 60캡슐/PTP, 120캡슐/PTP

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는
오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회 고시 "품목별 소비자
분쟁해결기준"에 의거 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

DS-1707-00

첨부문서 최초 작성년월일 2017. 07. 24

이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 동성제약 홈페이지(www.dongsung-pharm.com) 및
식품의약품안전처 홈페이지 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 해당 제품정보란에서
확인할 수 있습니다.

[제조사] (주)서흥

[제조외역사] 동성제약주식회사