

알메치린 연질캡슐

전문의약품
분류번호:239

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

- 유효성분 : 알베리시트르산염(별규) 60 mg
시메티콘(LSP) 300 mg

- 첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색203호, 황색5호
- 동물유래성분 : 젤라틴(기원동물 : 소, 사용부위 : 가죽내피)
- 기타첨가제 : 농글리세린, 산화티탄, 소르비톨액(비결정형), 에틸바닐린

[성상] 흰색의 점조액이 든 녹색의 타원형 연질캡슐

[효능 및 효과]

위장관계 경련의 진경 및 장내 가스 제거, 복부팽만으로 인한 소화기계 통증의 경감

[용법 및 용량] 1회 1캡슐, 1일 2~3회 식전에 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음환자에게는 투여하지 말 것

- 1) 이 약의 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 저혈압 환자
- 3) 무력성 장폐색증 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 이상반응

이 약을 투여하는 동안 바람직하지 않거나 불필요한 효과가 나타날 수 있다.

- 1) 과민반응 : 드물게 두드러기, 가려움증, 발진 및 анафилакти시스를 포함하는 알러지반응이 나타날 수 있으며 후두부종, 속을 동반할 수 있다.
- 2) 소화기계 : 때때로 연변, 복부불쾌감, 설사, 복통, 구토, 구역, 복부중압감, 식욕부진이 나타날 수 있다.
- 3) 기타 : 드물게 간기능 이상이 나타날 수 있고 투여 중단 후 정상화 될 수 있으며, 드물게 두통, 어지럼증이 나타날 수 있다.
- 4) 국내에서 6년동안 786명을 대상으로 실시한 시판후 조사결과 변비 1례가 보고되었다.

4. 일반적 주의

- 1) 도핑테스트를 실시할 때 양성반응을 일으킬 수 있다.
- 2) 장해된 용법 · 용량을 지켜야 한다.
- 3) 이 약의 복용으로 이상증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사에게 알린다.
- 4) 다른 약물과의 잠재적인 상호작용을 피하기 위하여 복용중인 약물을 의사 또는 약사에게 알린다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 임부

동물시험에서 중대한 태아독성 또는 최기형성을 나타내지는 않았으나, 사람에 대해서는 확인되지 않았으며, 임신기간 중의 약물의 사용은 신중하여야 하기 때문에 임부에게는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

2) 수유부

검토된 바가 없으므로 수유부에게는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

6. 어린이에 대한 투여

12세 미만의 어린이에는 권장되지 않는다.

7. 과량투여시의 처치

과량 투여시 저혈압 및 아트로핀 유사 독성이 나타날 수 있다. 과량투여시 처치는 저혈압에 대한 보조요법과 함께 아트로핀 해독과 동일한 요법을 행한다.

8. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것

[포장단위] 30캡슐/병, 300캡슐/병

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

[수신자부담고객상담실] 080-988-8889

[제조회사] 조아제약(주) 경상남도 함안군 함안면 광정로 318

인터넷홈페이지 <http://www.choa.co.kr>

[제조자] (주)동구바이오제약 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 18

※ 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.

※ 본 첨부문서의 내용은 최신정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용 전에 주의깊게 읽어주시고, 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

※ 의약품용 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품안전나라(<http://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.

※ 표시되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처에 전달하십시오.

※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

개정연월일 : 2020. 02. 20 (Rev.0)