전문의약품 KGMP 적격업체 제품

콤비로칸정

5/8mg • 10/8mg • 10/16mg • 20/32mg

로수바스타틴칼슘 · 칸데사르탄실렉세틸

■ 원료약품의 분량 : 1정 중
- 콤비로칸정 5/8mg :
  - 로수바스타틴칼슘(벌크) ····· 5.2mg(로수바스타틴으로서 5mg)
  - 칸데사르탄실렉세틸(USP) ····· 8.0mg
  - 첨가제(동물유래) : 유당수화물
- 콤비로칸정 10/8mg :
  - 로수바스타틴칼슘(벌크) ····· 10.4mg(로수바스타틴으로서 10mg)
  - 칸데사르탄실렉세틸(USP) ····· 8.0mg
  - 첨가제(동물유래) : 유당수화물
- 콤비로칸정 10/16mg :
  - 로수바스타틴칼슘(벌크) ····· 10.4mg(로수바스타틴으로서 10mg)
  - 칸데사르탄실렉세틸(USP) ····· 16.0mg
  - 첨가제(동물유래) : 유당수화물
- 콤비로칸정 20/32mg :
  - 로수바스타틴칼슘(벌크) ····· 20.8mg(로수바스타틴으로서 20mg)
  - 칸데사르탄실렉세틸(USP) ····· 32.0mg
  - 첨가제(동물유래) : 유당수화물

■ 성상 • 콤비로칸정 5/8mg : 분홍색의 원형 필름코팅정
• 콤비로칸정 10/8mg : 분홍색의 원형 필름코팅정
• 콤비로칸정 10/16mg : 노란색의 원형 필름코팅정
• 콤비로칸정 20/32mg : 분홍색의 원형 필름코팅정

■ 효능 · 효과
이 약은 두 약물(칸데사르탄실렉세틸과 로수바스타틴)을 동시에 투여하여야 하는 환자에만 사용합니다.

○ 칸데사르탄실렉세틸
1. 본태고혈압
2. 심부전 : 좌심실수축기능이 손상된(NYHA class II-IV, 좌심실박출률 40% 이하) 환자 중 다음에 해당하는 경우
   1) ACE억제제에 대한 추가요법이 필요한 경우
   2) ACE억제제에 내약성이 좋지 않은 경우

○ 로수바스타틴
1. 원발성 고콜레스테롤혈증(이형접합 가족성 고콜레스테롤혈증을 포함하는 type IIa), 복합형 고지혈증(type IIb) : 식이 및 운동으로 조절이 안 될 경우 식이요법의 보조제
2. 동형접합 가족성 고콜레스테롤혈증에 식이요법이나 다른 지질저하요법(예: LDL 분리반출법)의 보조제
3. 고콜레스테롤혈증 환자에서 총콜레스테롤과 LDL-콜로스테롤을 목표 수준으로 낮추어 죽상동맥경화증의 진행을 지연
4. 원발성 이상베타리포프로테인혈증(type III) 환자의 식이요법 보조제
5. 심혈관 질환에 대한 위험성 감소 : 관상동맥 심질환에 대한 임상적 증거는 없으나, 만 50세 이상의 남성 및 만 60세 이상의 여성으로 고감도 C-반응단백(high sensitive C-reactive protein, hsCRP)이 2mg/L 이상이며, 적어도 하나 이상의 추가적인 심혈관질환 위험 인자(예: 고혈압, 낮은 HDL-콜레스테롤치, 흡연 또는 조기 관상동맥 심질환의 가족력 등)를 가진 환자의
   - 뇌졸중에 대한 위험성 감소
   - 심근경색에 대한 위험성 감소
   - 동맥 혈관재형성술에 대한 위험성 감소

■ 용법 · 용량
이 약은 성인에 한하여 투여하며, 투여용량은 칸데사르탄실렉세틸/로수바스타틴 각 성분의 효과 및 내약성에 근거하여 각 환자에서 개별화되어야 합니다.

○ 칸데사르탄실렉세틸
1. 본태고혈압
   1) 성인 : 초회용량 및 유지용량으로 1일 1회 칸데사르탄실렉세틸로서 8~16mg 경구 투여가 권장됩니다. 1일 1회 16mg으로 4주간 치료 후에도 혈압이 충분히 조절되지 않는 경우, 최대 1일 1회 32mg까지 증량할 수 있습니다. 이 용량으로도 혈압이 조절되지 않는 경우, 다른 치료법을 고려하여야 합니다. 치료개시 4주 이내에 최고효과가 발현된다.
   2) 고령자 : 초기용량을 조절할 필요가 없습니다.
   3) 혈관내 유효혈액량 감소(intravascular volume depletion) 환자 : 유효 혈액량 감소와 같이 저혈압의 위험성이 높은 환자에 대하여 세심하게 주의하면서 초기용량으로 4mg을 투여합니다.
   4) 신장애 환자 : 혈액투석환자를 포함한, 신장애 환자의 초기용량은 4mg으로, 환자의 반응에 따라 용량을 조절합니다. 중증 또는 말기 신장애 환자(크레아티닌청소율 < 15mL/min)에 대한 사용경험이 제한적입니다.
   5) 간장애 환자 : 경증에서 중등도 간장애 환자의 초기용량은 1일 1회 2mg으로, 환자의 반응에 따라 용량을 조절합니다. 중증의 간장애 환자에 대한 사용경험이 없습니다.
   6) 소아 : 만 18세 이하의 청소년 및 소아에 대한 안전성 및 유효성은 확립되어 있지 않습니다.
2. 심부전
   1) 성인 : 초기용량은 1일 1회 4mg이 권장됩니다. 2주 이상의 간격을 두고 용량을 2배씩 증량하며, 환자의 내약성을 고려하여 최대 1일 1회 32mg까지 증량할 수 있습니다.
   2) 고령자, 혈관내 유효혈액량 감소환자, 신장애 환자, 경증에서 중등도 간장애 환자 : 초기용량을 조절할 필요가 없습니다.
   3) 소아 : 만 18세 이하의 청소년 및 소아에 대한 안전성 및 유효성은 확립되어 있지 않습니다.

○ 로수바스타틴
1. 원발성 고콜레스테롤혈증(이형접합 가족성 고콜레스테롤혈증을 포함하는 type IIa, 복합형 고지혈증(type IIb) : 통상 성인 초기용량은 10mg 1일 1회이며, 투여 4주 이후 치료반응을 고려하여 용량을 조절합니다. 용량범위는 5~40mg 1일 1회입니다. 최대 1일 투여량은 40mg입니다.
2. 동형접합 가족성 고콜레스테롤혈증 : 통상 성인 초기용량은 20mg 1일 1회이며, 투여 4주 이후 치료반응을 고려하여 용량을 조절합니다. 최대 1일 투여량은 40mg입니다.
3. 고콜레스테롤혈증 환자에서 총콜레스테롤과 LDL-콜로스테롤을 목표 수준으로 낮추어 죽상동맥경화증의 진행을 지연 : 통상 성인 초기용량은 10mg 1일 1회이며, 투여 4주 이후 치료반응을 고려하여 용량을 조절합니다. 최대 1일 투여량은 40mg입니다.
4. 원발성 이상베타리포프로테인혈증(type III) 환자의 식이요법 보조제 : 통상 성인 초기용량은 10mg 1일 1회이며, 투여 4주 이후 치료반응을 고려하여 용량을 조절합니다. 최대 1일 투여량은 40mg입니다.
5. 심혈관 질환에 대한 위험성 감소 : 관상동맥 심질환에 대한 임상적 증거는 없으나, 만 50세 이상의 남성 및 만 60세 이상의 여성으로 고감도 C-반응단백(high sensitive C-reactive protein, hsCRP)이 2mg/L 이상이며, 적어도 하나 이상의 추가적인 심혈관질환 위험 인자(예: 고혈압, 낮은 HDL-콜레스테롤치, 흡연 또는 조기 관상동맥 심질환의 가족력 등)를 가진 환자의
   - 뇌졸중에 대한 위험성 감소
   - 심근경색에 대한 위험성 감소
   - 동맥 혈관재형성술에 대한 위험성 감소

■ 용법 · 용량
이 약은 성인에 한하여 투여하며, 투여용량은 칸데사르탄실렉세틸/로수바스타틴 각 성분의 효과 및 내약성에 근거하여 각 환자에서 개별화되어야 합니다.

○ 칸데사르탄실렉세틸
1. 본태고혈압
   1) 성인 : 초회용량 및 유지용량으로 1일 1회 칸데사르탄실렉세틸로서 8~16mg 경구 투여가 권장됩니다. 1일 1회 16mg으로 4주간 치료 후에도 혈압이 충분히 조절되지 않는 경우, 최대 1일 1회 32mg까지 증량할 수 있습니다. 이 용량으로도 혈압이 조절되지 않는 경우, 다른 치료법을 고려하여야 합니다. 치료개시 4주 이내에 최고효과가 발현된다.
   2) 고령자 : 초기용량을 조절할 필요가 없습니다.
   3) 혈관내 유효혈액량 감소(intravascular volume depletion) 환자 : 유효 혈액량 감소와 같이 저혈압의 위험성이 높은 환자에 대하여 세심하게 주의하면서 초기용량으로 4mg을 투여합니다.
   4) 신장애 환자 : 혈액투석환자를 포함한, 신장애 환자의 초기용량은 4mg으로, 환자의 반응에 따라 용량을 조절합니다. 중증 또는 말기 신장애 환자(크레아티닌청소율 < 15mL/min)에 대한 사용경험이 제한적입니다.
   5) 간장애 환자 : 경증에서 중등도 간장애 환자의 초기용량은 1일 1회 2mg으로, 환자의 반응에 따라 용량을 조절합니다. 중증의 간장애 환자에 대한 사용경험이 없습니다.
   6) 소아 : 만 18세 이하의 청소년 및 소아에 대한 안전성 및 유효성은 확립되어 있지 않습니다.
2. 심부전
   1) 성인 : 초기용량은 1일 1회 4mg이 권장됩니다. 2주 이상의 간격을 두고 용량을 2배씩 증량하며, 환자의 내약성을 고려하여 최대 1일 1회 32mg까지 증량할 수 있습니다.
   2) 고령자, 혈관내 유효혈액량 감소환자, 신장애 환자, 경증에서 중등도 간장애 환자 : 초기용량을 조절할 필요가 없습니다.
   3) 소아 : 만 18세 이하의 청소년 및 소아에 대한 안전성 및 유효성은 확립되어 있지 않습니다.

○ 로수바스타틴
1. 원발성 고콜레스테롤혈증(이형접합 가족성 고콜레스테롤혈증을 포함하는 type IIa, 복합형 고지혈증(type IIb) : 통상 성인 초기용량은 10mg 1일 1회이며, 투여 4주 이후 치료반응을 고려하여 용량을 조절합니다. 용량범위는 5~40mg 1일 1회입니다. 최대 1일 투여량은 40mg입니다.
2. 동형접합 가족성 고콜레스테롤혈증 : 통상 성인 초기용량은 20mg 1일 1회이며, 투여 4주 이후 치료반응을 고려하여 용량을 조절합니다. 최대 1일 투여량은 40mg입니다.
3. 고콜레스테롤혈증 환자에서 총콜레스테롤과 LDL-콜로스테롤을 목표 수준으로 낮추어 죽상동맥경화증의 진행을 지연 : 통상 성인 초기용량은 10mg 1일 1회이며, 투여 4주 이후 치료반응을 고려하여 용량을 조절합니다. 최대 1일 투여량은 40mg입니다.
4. 원발성 이상베타리포프로테인혈증(type III) 환자의 식이요법 보조제 : 통상 성인 초기용량은 10mg 1일 1회이며, 투여 4주 이후 치료반응을 고려하여 용량을 조절합니다. 최대 1일 투여량은 40mg입니다.
5. 심혈관 질환에 대한 위험성 감소 : 관상동맥 심질환에 대한 임상적 증거는 없으나, 만 50세 이상의 남성 및 만 60세 이상의 여성으로 고감도 C-반응단백(high sensitive C-reactive protein, hsCRP)이 2mg/L 이상이며, 적어도 하나 이상의 추가적인 심혈관질환 위험 인자(예: 고혈압, 낮은 HDL-콜레스테롤치, 흡연 또는 조기 관상동맥 심질환의 가족력 등)를 가진 환자의
   - 뇌졸중에 대한 위험성 감소
   - 심근경색에 대한 위험성 감소
   - 동맥 혈관재형성술에 대한 위험성 감소

■ 사용상의 주의사항
1. 경고
   일부에게 제닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)에 직접 작용하는 약물들의 투여 시, 태아 및 신생아에게 손상 및 사망까지도 일어날 수 있으며, 이러한 사례는 안지오텐신 II 수용체 길항제를 복용한 환자에서도 세계적으로 수십 례가 보고된 바 있습니다. 따라서 만일 임신으로 확인될 경우 즉시 이 약의 투여를 중단해야 합니다.(7. 임부 및 수유부에 대한 투여 참조).
2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오
   1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
   2) 원인 불명의 지속적인 혈청 트랜스아미나제 상승 또는 정상 상한치의 3배를 초과하는 혈청 트랜스아미나제 상승을 포함하는 활동성 간질환 환자
   3) 임부 및 수유부, 적절한 피임 방법을 사용하지 않는 가임여성
      • 출산이 가능한 연령의 여성에 이 약을 투여 시 임신하지 않을 가능성이 높은 경우와 태아에 대한 잠재적인 위험성에 대해 알려주었을 때만 투여합니다.
   4) 중증 간질환 환자 및/또는 담즙정체 환자
   5) 근병증 환자
   6) 유전성 갈락부족증 환자이거나, ACE억제제 혹은 안지오텐신 II 수용체 길항제 치료 시 혈관부종의 병력이 있는 환자
   7) 중증의 신부전의 신장애 환자(creatinine clearance(CL_{cr}) < 30mL/min)
   8) 사이크로스포린 병용투여 환자
   9) 당뇨병이나 중등도~중증의 신장애 환자(사구체여과율 < 60mL/min/1.73m²)에서 알리스키렌 함유제제와의 병용

10) 근병증/횡문근융해증에 걸리기 쉬운 환자들에게 로수바스타틴 40밀리그램 용량 투여는 금기입니다. 이러한 인자들은 아래와 같습니다.
   - 중등도의 신장애(크레아티닌 청소율 < 60mL/min)
   - 갑상선기능저하증
   - 유전적인 근질환 병력 또는 가족력이 있는 경우
   - 다른 HMG-CoA 전환효소 또는 피브레이트 계열 약물에 대한 근육 독성의 병력이 있는 경우
   - 알코올 중독
   - 혈장 농도가 증가할 수 있는 상황
   - 아시아계 환자
   - 피브레이트 계열 약물 병용투여
11) 원발고알도스테론혈증 환자(이 약물에 잘 반응하지 않습니다.)
12) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactose deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
   1) 고령자(9. 고령자에 대한 투여 항 참조)
   2) 고칼륨혈증 환자 혹은 혈청 칼륨치가 높아지기 쉬운 환자
   3) 경증에서 중등도 간장애 환자(예: 간경변 환자)
   4) 다른 HMG-CoA 환원효소 저해제와 마찬가지로 이 약은 알코올을 과다 섭취하거나 간질환의 병력이 있는 환자에 투여 시 주의해야 합니다. 이 약 투여 시작 전 및 그 후 임상적 필요에 따라 빈번하여 간효소 검사를 실시할 것을 권고합니다. 간상선기능저하증이나 신증후군에 의한 2차적 고콜레스테롤혈증 환자는 이 약을 투여하기 전에 원인 질환을 치료해야 합니다.
   5) 대동맥판 및 승모판 협착증 환자 혹은 폐쇄비대심근병 환자
   6) 허혈 심장병, 뇌혈관 장애 환자(과도한 혈압감하는 심혈류 부전에 따른 심근경색이나 뇌혈류 부전으로 인한 뇌졸중을 일으킬 수 있습니다.)
   7) 양측성 혹은 단일 신장에서의 편측성 신동맥 협착증이 있는 환자(신혈류량의 감소나 사구체 여과압의 저하에 의해 급속히 신기능을 악화시킬 우려가 있습니다.)
   8) 혈관내 유효혈액량 감소환자
   9) 신장애 환자(파도한 감압에 의해 신장 기능이 더욱 악화될 우려가 있습니다.)
   10) 신장 이식을 한 환자
   11) 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)의 이중차단 : 안지오텐신 II 수용체 길항제(ARB), ACE억제제, 또는 알리스키렌 등 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)에 영향을 미치는 다른 약제의 병용은 권장되지 않습니다.
   12) 다른 HMG-CoA 환원효소 저해제와 마찬가지로 골격근에 대한 효과, 예를 들면, 근육통 및 근병증, 드물게 횡문근융해증이 이 약을 투여받은 환자에서 보고되었습니다. 로수바스타틴을 포함하여 스타틴을 복용 중이거나 중단한 환자에서, 면역매개성괴사성근병증이 보고되었습니다. 면역매개성 근병증은 임상적 특징으로 근위근 약화 및 혈중 CK(Creatine kinase)의 증가를 나타내며, 투여중지 이후에도 그 증상이 지속됩니다.
      • 다른 HMG-CoA 환원효소 저해제와 마찬가지로 근병증/횡문근융해증에 걸리기 쉬운 요인을 갖고 있는 다음의 환자에서는 치료의 위험성과 유익성의 고려되어야 하며, 임상 모니터링이 권장됩니다. 치료 전에 CK(Creatine kinase)값이 기저수준에서 유의성있게 증가(정상 상한치의 5배 이상 증가)되어 있는 경우 치료를 시작해서는 안 됩니다.
      - 신장애환자
      - 갑상선기능저하증
      - 유전적인 근질환의 병력 또는 가족력이 있는 경우
      - 다른 HMG-CoA 환원효소 저해제 또는 피브레이트에 대한 근육 독성의 병력이 있는 경우
      - 알코올 남용
      - 70세 이상의 노인
      - 혈장 농도가 증가할 수 있는 상황
      - 피브레이트 계열 약물 병용투여
      • 치료 중에는 특히 권태감이나 열과 관련이 있을 경우, 다른 이유로 설명되지 않는 근육통이나 근육쇠약, 경련을 즉시 보고해야 합니다. 이러한 환자에서 CK치를 측정해야 하고 이때 CK치가 현저히 상승되거나(정상 상한치의 5배 이상 증가), CK치가 정상 상한치의 5배 이하로 증가한다. 할지라도 근육 증상이 심하고 일상의 불편함을 야기한다면 이 약의 투여를 중단해야 합니다. 증상이 해결되고 CK치가 정상으로 돌아가면 면밀한 모니터링과 함께 이 약 또는 다른 HMG-CoA 환원효소 저해제를 최저 용량으로 재시작할 것을 고려해야 합니다. 무증상인 환자에서 일반적인 CK치의 모니터링은 필요하지 않습니다.
      • 측정 결과의 해석을 어렵게 할 수 있으므로 격렬한 운동 후나 CK값을 증가시킬 수 있는 기타 원인이 있는 경우는 CK를 측정하지 않도록 합니다. CK값이 기저상태에서 유의성있게 증가(정상 상한치의 5배 이상 증가)한 경우 5~7일 내에 확증시험이 수행되어야 합니다. 시험 반복 시에도 기저상태의 CK값이 정상 상한치의 5배 이상 증가한 경우 이 약을 투여하지 않습니다.
   13) 근병증이나, 횡문근융해증에 부차적인 신부전으로 악화될 것을 암시하는 급성 중증 상태(예를 들면, 패혈증, 저혈압, 대수술, 외상, 중증의 대사성/내분비성/전해질성 질환, 조절되지 않는 간질발작)에서는 이 약의 투여를 중단해야 합니다.
   14) 임상시험에서 로수바스타틴 단일제와 다른 약을 병용 투여한 소수의 환자에서 골격근에 대한 효과가 증가된 증거는 없습니다. 그러나 다른 HMG-CoA 환원효소 저해제들의 경우, 피브린산 유도체(겜피브로질 포함), 사이크로스포린, 니코틴산, azole계 항진균제, protease 저해제, macrolide 항생제 등을 함께 투여받은 환자에서 근염과 근병증의 빈도가 증가했다. 겜피브로질은 HMG-CoA 환원효소 저해제와 병용 시 근병증의 위험을 증가시킵니다. 따라서 이 약과 겜피브로질의 병용은 추천되지 않습니다. 이 약을 피브레이트 나이신과 병용투여 시 유익성과 위험성을 주의 깊게 평가하여야 합니다. 피브레이트 계열 약물과 병용투여할 때 로수바스타틴 40밀리그램 용량은 금기입니다.
   15) 로수바스타틴 고용량 특히 40mg 복용 환자에서, dipstick 테스트에 의해 검출되는 대부분이 세뇨관 기원인 단백뇨가 관찰되었습니다. 이것은 일반적으로 일시적이고 급성 또는 전행성 신부전의 예측 인자는 아닙니다. 40mg 투여 환자의 추적기간 동안에는 신기능 검사를 고려하여야 합니다.
   16) 로수바스타틴 약동학 시험에 의하면 코카시아인과 비교시 아시아인에서 전신 노출의 증가(AUC 및 Cmax의 중앙값이 약 2배 증가)가 나타났으므로 아시아인에게 용량결정 시 이러한 사항을 고려하여야 합니다.
4. 이상반응
   이 약에 대한 안전성은 원발성 고콜레스테롤혈증을 동반한 본태성 고혈압 환자 2177명을 대상으로 한 무작위배정, 이중눈가림 임상시험에서 평가되었습니다. 이 약의 이상반응 발현양상은 각 단일요법군과 유사하였으며, 각 개별 성분의 기 보고된 안전성 범위 이내로 상기적인 증복 독성(overlapping toxicity)이 우려되는 사항은 관찰되지 않았습니다.

○ 6주간의 처방기 동안 수집된 이상반응
   이 약에 대한 안전성은 원발성 고콜레스테롤혈증을 동반한 본태성 고혈압 환자 2177명을 대상으로 한 무작위배정, 이중눈가림 임상시험에서 평가되었습니다.
   치료 기간(6주) 중 가장 빈번하게 발생한 이상반응은 두통으로 이 약 투여군, 로수바스타틴 투여군, 칸데사르탄실렉세틸 투여군에서 각각 7.04%(52/), 4.11%(3건), 5.48%(4건)씩 보고되었습니다. 이 외 이 약 투여군에서 기려움증, 로수바스타틴 투여군에서 구역, 칸데사르탄실렉세틸 투여군에서 전신기려움증이 각각 1건씩 약물이상반응으로 보고되었으며 모두 경증 또는 중등증이었습니다.
   이 약과 인과관계를 배제할 수 없다고 평가된 약물이상반응은 다음과 같습니다.
   〈표 2〉 약물이상반응

신체 기관별	이상반응(%)		
	이 약 투여군(N=71)	로수바스타틴 투여군(N=73)	칸데사르탄실렉세틸 투여군(N=73)
신경계 장애			
두통	7.04	4.11	5.48
어지러움	0	0	1.37
체위성 어지러움	0	0	1.37
감염			
비인두염	2.82	2.74	1.37
맥립종	0	1.37	0
국소감염	1.41	0	0
치주염	0	0	1.37
혈관계 장애			
기슴불편감	0	1.37	0
피로	1.41	0	0
엄증	0	0	1.37
이물감	0	1.37	0
피부 및 피하조직 장애			
전신기려움증	1.41	0	1.37
피부염	0	1.37	0
기려움증	1.41	0	0
근골격계 및 결합조직 장애			
관절염직	1.41	0	0
근육골격통증	0	0	1.37
목통증	0	0	1.37
사지통증	1.41	0	0
안복계 장애			
백내장	0	0	1.37
눈부심	1.41	0	0
위장장애			
소화불량	1.41	0	0
구역	0	1.37	0
실험실 검사			
혈당상승	0	0	1.37
혈중니트롤감소	0	0	1.37
부상, 중독 및 합병증			
손골절	1.41	0	0
대사 및 영양장애			
저혈당증	0	1.37	0
신장 및 비뇨기계 장애			
신석증	0	1.37	0
호흡기계 장애			
기침	0	0	1.37
외과적 및 내과적 시술			
발치	0	0	1.37

이 가간 중 가장 빈번하게 발생한 약물이상반응은 3군 모두 두통으로 이 약 투여군, 로수바스타틴 투여군, 칸데사르탄실렉세틸 투여군에서 각각 4.23%(3건), 4.11%(3건), 5.48%(4건)씩 보고되었습니다. 이 외 이 약 투여군에서 기려움증, 로수바스타틴 투여군에서 구역, 칸데사르탄실렉세틸 투여군에서 전신기려움증이 각각 1건씩 약물이상반응으로 보고되었으며 모두 경증 또는 중등증이었습니다.
이 약과 인과관계를 배제할 수 없다고 평가된 약물이상반응은 다음과 같습니다.
〈표 2〉 약물이상반응

신체 기관별	이상반응(%)		
	이 약 투여군(N=71)	로수바스타틴 투여군(N=73)	칸데사르탄실렉세틸 투여군(N=73)
신경계 장애			
두통	4.23	4.11	5.48
체위성 어지러움	0	0	1.37
피부 및 피하조직 장애			
기려움증	1.41	0	0
전신기려움증	0	0	1.37
위장장애			
구역	0	1.37	0

이제에 열시된 정보는 칸데사르탄실렉세틸 및 로수바스타틴 개개의 성분에 대한 임상시험 및 시판 후 경험에서 수집된 것을 근거로 한 것입니다.

○ 칸데사르탄실렉세틸에서 수집된 정보
1) 본태고혈압의 치료
   일반적으로 이상반응은 경미하고 일시적이었으며, 발현율은 용량, 연령, 성별과 무관하였습니다. 이상반응으로 인해 치료를 중단하는 사례는 이 약과 위약군에서 유사하였습니다.
   (1) 임상시험 결과, 칸데사르탄실렉세틸군에서 적어도 1% 이상 발생하였고 위약군에 비해 높은 비율로 발생한 이상반응은 다음과 같습니다.
      ① 정신신경계 : 어지럼
      ② 근골격계 : 요통
      ③ 호흡기계 : 호흡기감염(상기도 감염, 인두염, 비염)
   (2) 임상시험 결과, 1% 이상의 비율로 발생하였지만 이 약에 비하여 위약 투여군에서 같거나 더 높은 비율로 발생한 이상반응은 다음과 같습니다 : 피로, 발초부종, 흉통, 두통, 기관지염, 기침, 부비강염, 구역, 복통, 설사, 구토, 관절통, 단백뇨
   (3) 임상시험 결과, 이 약과의 인과관계에 상관없이 0.5% 이상의 발생률로 보고된 중요한 이상반응은 다음과 같습니다.
      ① 전신 : 무력증, 발열
      ② 중추 및 말초신경계 : 지각이상, 어지럼
      ③ 소화기계 : 소화불량, 위장염
      ④ 심혈관계 : 빈맥, 심계항진
      ⑤ 대사 및 영양 : 크레아틴키나아제(CK) 증가, 고혈당, 고중성지방혈증, 고요산혈증
      ⑥ 근골격계 : 근육통
      ⑦ 혈소판 및 출혈 : 비출혈
      ⑧ 정신신경계 : 불안, 우울증, 졸음증
      ⑨ 호흡기계 : 호흡곤란
      ⑩ 피부 및 부속기관 : 발진, 발한증가
      ⑪ 비뇨기계 : 혈뇨
2) 심부전의 치료
   심부전 환자에서의 이상반응 발현양상은 약리작용 및 환자의 건강상태와 일치하였습니다. 이 약 32mg(n=3,803)군과 위약(n=3,796)군을 비교한 CHARM 임상시험에서 이 약 투여군의 21.0%, 위약군의 16.1%가 이상반응으로 인하여 투여를 중단하였습니다. 자주(≥ 1/100, < 1/10) 나타난 이상반응은 저혈압, 고칼륨혈증, 신기능 손상, 크레아티닌, 요소, 칼륨의 증가였습니다. 용량을 증가하는 동안과 그 이후 정기적으로 혈청칼륨과 크레아티닌 수치를 모니터링 하는 것이 권장됩니다.
3) 일반적으로 이 약은 임상적인 실험실적 인자들에 임상적으로 유의할만한 영향을 미치지 않았습니다. 다른 레닌-안지오텐신-알도스테론계 억제제와 마찬가지로 헤모글로빈과 헤마토크리트치가 약간 감소하였습니다. 크레아티닌, 요소, 칼륨의 증가와 나트륨의 감소가 관찰되었습니다. 이상반응으로 ALT의 상승이 이 약 투여군에서 위약군에 비해 약간 높은 빈도로 보고되었습니다.(1.3% vs 0.5%). 이 약을 투여받은 환자에서 실험실적 인자들의 임상적인 모니터링은 필요하지 않으나, 신기능 손상자에서는 혈청칼륨과 크레아티닌 수치를 정기적으로 모니터링 하는 것이 권장됩니다.
4) 시판 후 조사에서 매우 드물거나(< 1/10,000) 빈도를 알 수 없게 나타난 이상반응은 다음과 같습니다.
   (1) 혈액 및 림프계 : 백혈구감소증, 호중구감소증이 나타날 수 있습니다. 또한 무과립구증이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히하고 이상이 인정되는 경우에는 는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
   (2) 대사 및 영양이상 : 고칼륨혈증, 저나트륨혈증, 저혈당(당뇨병 치료 중인 환자에서 나타나기 쉽습니다.)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 무력감, 공복감, 식욕땀, 손 떨림, 집중력 저하, 경련, 의식 장애 등이 나타난 경우 에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
   (3) 신경계 : 어지럼, 두통이 나타날 수 있습니다.
   (4) 호흡기계, 흉부 · 종격계 : 기침
   (5) 소화기계 : 구역이 나타날 수 있습니다.
   (6) 간담도계 : 간 효소치 증가, 간염이 나타날 수 있습니다. 또한 AST, ALT, γ-GTP 상승 등의 간기능 장애, 황달이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
   (7) 피부 및 피하조직 : 발진, 두드러기, 가려증증이 나타날 수 있습니다. 또한 혈관부종(얼굴, 구순 · 혀, 인 · 후두 등의 종창)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
   (8) 근육통, 무력감, 크레아틴키나아제(CK) 상승, 혈중 및 요중 미오글로빈 상승을 특징으로 하는 횡문근융해가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히하고 이러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
   (9) 근골격계 : 관절통, 근육통, 요통이 나타날 수 있습니다.
   (10) 신장 및 비뇨기계 : 신기능손상, 급성 신부전이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
   (11) 발열, 해소, 호흡곤란, 흉부압전 이상 등을 동반하는 간질성 폐렴이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하고 부신 피질 호르몬제의 투여 등 적절한 처치를 합니다.
   (12) 쇼크, 실신, 의식 소실(만성 심부전의 경우, 실신, 의식 소실은 0.1~5%) : 쇼크, 혈압 강하에 따른 실신, 의식 소실이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 차가운 느낌, 구토, 의식 소실 등이 나타날 경우에는 즉시 적절한 처치를 합니다. 특히 혈액 투석, 엄격한 염분 제한, 이뇨제 투여 중 또는 심부전 환자에서는 소량부터 투여를 시작하고 증량하는 경우 환자의 상태를 충분히 관찰하면서 서서히 해야합니다.
5) 국내에서 재심사를 위하여 6년 등안 15,986명을 대상으로 실시한 시판 후 조사결과 이상반응의 발현증례율은 인과관계와 상관없이 1.06%(169명/15,986명)로 보고되었고, 이 중 이 약과 인과관계가 있는 것으로 조사된 것은 0.82%(128명/15,986명)입니다. 인과관계와 상관없이 이자람이 0.30%(47명)로 가장 많았고, 그 다음은 두통 0.22%(36명), 기침 0.17%(28명)의 순으로 나타났습니다. 이중 시판 전 임상시험에서 나타나지 않았던 새로운 이상반응은 다음과 같습니다.
   (1) 중추 및 말초신경계 : 마비(2명), 긴장항진(1명)
   (2) 전신 : 실신(1명), 얼굴홍조(1명), 체중증가(1명), 얼굴부종(1명)
   (3) 위장관계 : 구갈(2명)
   (4) 정신신경계 : 수면장애(2명), 성욕감소(1명), 건망증(1명), 식욕부진(2명), 식욕증진(1명)
   (5) 감각기관 : 이명(1명), 미각도착(1명)
   (6) 생식기계 : 발기부전(1명)

○ 로수바스타틴칼슘에서 수집된 정보
1) 보고된 이상반응은 일반적으로 경미하고 일시적이었습니다. 이상반응으로 연구를 중단한 환자는 이 약 투여군 중 4% 미만이었습니다.
   이상반응의 발현빈도는 다음과 같이 분류하였습니다 :
   흔하게(≥ 1/100, < 1/10);
   흔하지 않게(≥ 1/1,000, < 1/100);

발현부위	증상별 발현빈도		
	흔하게	흔하지 않게	드물게
면역계			혈관부종을 포함한 과민 반응
내분비계	당뇨[1]		
신경계	두통, 어지러움		
위장관계	변비, 구역, 복통		췌장염
피부 및 피하조직		가려움증, 발진 및 두드러기	
근골격계 및 결합조직	근육통		근육병증(근육염 포함), 횡문근융해증
전신	무력증		

주1 : JUPITER 임상시험에서 공복 시 혈당이 5.6~6.9mmol/L 환자에서 가장 많이 보고된 이상반응(로수바스타틴 투여군 2.8%, 위약군 2.3% 보고)
다른 HMG-CoA 환원효소 저해제와 마찬가지로 용량 증가에 따라 이상반응이 증가하는 경향이 나타났습니다.
2) 신장에 미치는 영향 : Dipstick 테스트에 의해 검출되는 대부분이 세뇨관 기원인 단백뇨가 관찰되었습니다. 뇨단백이 음성 또는 극소량에서 ++ 이상으로 전환되는 현상이 10, 20밀리그램에서는 1%미만, 40밀리그램에서는 약 3%에서 나타났습니다. 뇨단백이 음성 또는 극소량에서 +로 약간 증가하는 것도 20밀리그램 용량에서 관찰되었습니다. 단백뇨는 대부분의 경우 치료 도중 감소하거나 자발적으로 사라졌으며 급성 또는 진행성 신부전의 예측 인자는 아닙니다. 이 약을 투여한 환자 및 임상시험자료에서 혈뇨가 관찰되었으나, 발현빈도는 낮았습니다.
3) 근골격계에 미치는 영향 : 급성 신부전과 함께 또는 급성 신부전 없이 근골격계에 미치는 영향(예: 근육통, 근육병증(근육염 포함), 드물게 횡문근융해증 등)이 이 약 모든 용량의 치료환자(특히 20밀리그램 이상)에서 보고되었습니다. 로수바스타틴을 투여받은 환자군에서 creatinine kinase(CK) 수치가 용량 의존적으로 증가하였습니다. 대부분의 경우 경미하고 무증상이었으며 일시적이었습니다. creatinine kinase(CK) 수치가 현저히 증가(정상상한의 5배 이상 증가)하는 경우 일시적으로 치료를 중단하여야 합니다.
4) 간에 미치는 영향 : 다른 HMG-CoA 환원효소 저해제와 마찬가지로, 이 약을 투여받은 소수의 환자에서 트랜스아미나제치가 용량 의존적으로 증가하였습니다. 대부분의 경우 경미하고 무증상이었으며 일시적이었습니다.
5) 국외 시판 후 경험
   위의 이상반응에 더하여 다음의 이상반응이 시판 후 조사동안 보고되었습니다.
   - 신경계 : 매우 드물게 다발성신경병증, 기억상실, 말초신경병증(빈도불명)
   - 호흡기계 및 흉부 : 기침, 호흡곤란(빈도 불명)