

일반의약품

분류번호 319

이젠 한 알로 해결하세요!

영진약품

영비원 정

YUNGB1 Tab.

【원료약품의 분량】이 약 1정 중

푸르실타이민(KP) 100mg

폴산(KP) 0.4mg

산화마그네슘(KP) 165.8mg(마그네슘으로서 100mg)

【성상】연한 노란색의 장방형 정제

【효능·효과】

다음 경우의 비타민 B₁의 보급

- 육체피로

- 임신·수유기

- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시

- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

· 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통 (요통, 어깨결림 등)

· 각기

· 눈의 피로

【용법·용량】

만 12세 이상 및 성인 1회 1정, 1일 1회 식후 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

2) 만 12개월 미만의 젖먹이

3) 심한 증상의 신부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2) 심장·순환기계기능 장애 환자

3) 신장장애 환자

4) 저단백혈증 환자

5) 임부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우

구역, 구토, 붉은 변, 설사, 구내염(입안염), 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하

2) 대장투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 윤혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

3) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의 할 것

4) 우발적으로 과량복용 한 경우

5) 1개월 정도 복용하여도 증상과 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것

2) 녹차, 홍차 등 탄산을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】 10정/병, 60정/병, 120정(60정/병×2)

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입하신 약국, 병원, 의원, 도매상을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 문서 작성일자(2017년 5월 29일) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 소비자상담실에서 확인할 수 있습니다.

소비자 상담실: 080-990-8200

홈페이지: www.yungjin.co.kr

문서최초일: 2017년 5월 29일

제조판매원: 영진약품(주)

공 장: 경기도 화성시 남양읍 무하로 66