

|       |         |
|-------|---------|
| 전문의약품 | 근육·정맥주사 |
| 분류번호  | 02190   |

# 지씨징코 주

## 은행엽엑스

GCGINKGO inj. Ginkgo Biloba Leaf Extract

### 【원료약품 및 그 분량】 1mL 중

주 성 분: 은행엽엑스(생규) ..... 3.5 mg  
(총 키크플라본배당체로서 0.84mg)  
첨가제(안정(화)제): D-소르비톨(KP) ..... 40.0 mg  
에탄올, 수산화나트륨, 주사용수

### 【성상】

얇은 갈색의 액이 들어있는 갈색앰플 주사제

### 【효능·효과】

- 1) 뇌혈액순환장애 및 뇌영양장애(뇌혈관부전), 다음 증상을 수반하는 뇌기능 장애: 지적 및 경각능력저하, 어지러움, 이명, 두통, 시력장애, 기억력감퇴, 불안, 우울감, 내이성난청, 혈관성·대사성 경부증상으로 인한 청각 및 언어능력 저하
- 2) 동맥경화성 혈관증, 괴저 상태의 당뇨병성 혈관손상, PAOD-(말초동맥폐색 질환 또는 간혈성파행증) 폐색성 혈관내막염, 레이노드병과 기타 호르몬성 및 신경성 혈관장애, 혈관증, 혈관증으로 인한 영양장애 등과 같은 말초동맥 순환장애

### 【용법·용량】

- 1일 5~10mL를 근육주사 또는 정맥주사하거나 2일마다 15mL를 정맥주사한다.
- 급성치료시: 1일 25mL를 정맥주사 또는 점적정주 한다.
- 중증치료시: 1일 25~50mL를 정맥주사 또는 점적정주 한다.

### 【사용상의 주의사항】

1. 경고  
앰플 주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단 사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것.
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것
  - 1) 이 약에 과민반응 또는 그 병력이 있는 환자
  - 2) 임부 또는 임신하고 있는 가능성이 있는 여성
3. 이상반응
  - 1) 드물게 가벼운 위장장애, 특히 알려지기가 있는 환자에게는 순환기장애 증상(저혈압, 현기증, 두통, 열감, 개인에 따라 심박동장애), 불면, 알려지성 피부증상이 일어날 수 있다.
  - 2) 개인에 따라 부분적으로 다소 빈번하게, 말단부위의 통증, 위장장애, 발열, 오한, 속 등이 관찰된다.
  - 3) 피로, 만성기도폐색, 하지부종, 협심증 유사증상이 나타날 수 있다.
4. 기타  
이 약은 당 대사에 영향을 주지 않는다는 보고가 있다.

### 【저장방법】

차광밀봉용기, 실온보관 (1~30 ℃)

### 【포장단위】

5mL X 10, 25, 50 앰플

- ※ 유효기간 또는 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 약국, 병·의원, 도매상에 한하여 각 영업소에서 교환하여 드립니다.
- ※ 이 첨부문서의 작성일자 (2017년 05월 23일) 이후 변경된 내용은 홈페이지 ([www.greencrosswb.com](http://www.greencrosswb.com)) 나 소비자상담실 (031-629-8690)로 문의하시기 바랍니다.

제조 및 판매자 :

 **녹십자웰빙**  
GREEN CROSS

충청북도 음성군 금왕읍 무극로65번길 26  
TEL: 031)629-8600 소비자상담실 ☎031)629-8690  
[www.greencrosswb.com](http://www.greencrosswb.com)