



정우반하후박탕정(단미엑스혼합제)

일반의약품 / 분류번호 : 190

【제품명】 정우반하후박탕정(단미엑스혼합제)

【성분 · 함량】 1회 용량 2정(1,020mg) 중

반하건조엑스(5.9~7.3→1)(별규)(반하로서 2.50g)	382.5mg
복령건조엑스(90.9~111.1→1)(별규)(복령으로서 2.00g)	20.0mg
후박건조엑스(18.2~22.2→1)(별규)(후박으로서 1.50g)	75.0mg
자소엽건조엑스(9.1~11.1→1)(별규)(자소엽으로서 1.00g)	100.0mg
생강건조엑스(26.0~31.7→1)(별규)(생강으로서 1.17g)	41.0mg
대추건조엑스(2.5~3.1→1)(별규)(대추로서 0.67g)	244.0mg

*동물유래성분 : 루디프레스(유당수화물/소/우유)

*기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 실리콘디옥사이드, 스테아르산마그네슘, 히드록시프로필셀룰로오스, 폴리에틸렌글리콜6000, 피마자유

【성상】 황갈색의 장방형 필름코팅 정제

【효능 · 효과】 한방건강보충용

【용법 · 용량】 한방건강보충용

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
- 3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 4) 지금까지 약에 의한 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 5) 어린이(어린이에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다).)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
피부 : 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움
- 2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 다른 한약(생약)제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.).
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 자사포장단위

본 의약품은 KGMP적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 보상받을 수 있습니다.

2017년 05월 29일 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 또는 문의☎ 02-574-2541에서 확인할 수 있습니다.



정우신약주식회사
충남 아산시 신창면 서부남로790번길 60

1707-01