



※ 의약품 사용하기 전에 다음 문서를 주의깊게 읽고 반드시 의약품과 함께 보관하세요.

파나신 배농산급탕 캡슐

일반의약품/분류번호:263

【제품명】 파나신캡슐(배농산급탕)

【원료약품 및 분량】 1캡슐(500mg) 중

길경(KP).....	0.67g
작약(KP).....	0.50g
자실(KP).....	0.50g
김초(KP).....	0.50g
대추(KP).....	0.50g
건강(KP).....	0.17g
.....	이상 수침건조엑스로서 405mg

· 동물유래성분 : 유당수화물/소/우유

· 첨가제(타르색소) : 황색5호, 황색203호, 적색40호, 청색1호

· 기타첨가제 : 옥수수전분, 클로이드성이산화규소, 스테아르산마그네슘, 카르복시메틸셀룰로오스, 캡슐

【성 상】 갈색의 가루가 충전된 상부 갈색, 하부 연한노란색의 경질캡슐제

【효능·효과】 발적(충혈되어 붉어짐), 부기, 단단해지고 통증을 수반하는 화농(끓음)성질환

【용법·용량】 보통 성인 1회 2캡슐을 1일 3회 식전 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에) 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 발적(충혈되어 붉어짐), 부기, 통증 등의 국소 증상 이외의 두통, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열 등의 전신 증상을 동시에 수반하는 환자
- 2) 한성농양(고름집)(寒性膿瘍, 열이 없는 농양(고름집)), 만성종기 환자
- 3) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 이 약은 황색 5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 고혈압 환자
- 2) 심장예 또는 신장예(신장장애) 환자
- 3) 부종(부기) 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
- 5) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 7) 지금까지 약에 의해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 8) 어린이(어린이에 대한 안전성이 확보되어 있지 않다(사용경험이 적다.))

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

상당시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타날 경우

- (1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아 지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고인 쌓임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)
 - (2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것
 - (3) 피부 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등
 - (4) 소화기계 : 위부(상복부)불쾌감 등
- 2) 5~6일 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 3) 이 약의 복용에 의해 드물게 증상이 악화되는 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과 의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
- 2) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 3) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프제 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드제 이뇨제(트리클로르메티아지드)와 병용(함께 복용(사용))시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.
- 4) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용후 반드시 밀폐 보관할 것).
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【포 장 단 위】 10캡슐/PTP, 20캡슐/PTP

【저 장 방 법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사 용 기 간】 제조일로부터 36개월

【제 조 자】 정우신약(주) / 충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 60

본 의약품은 KGMP적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질·변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 보상받을 수 있습니다.

*최종수정일자(2018년 02월 14일) 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 또는 문의 (☎02-574-2541)에서 확인할 수 있습니다.



정우신약주식회사
충남 아산시 신창면 서부남로790번길 60

1802-01