

센테라이트 정 [센텔라 정량 추출물]

센텔라 정량 추출물 센테라이트 정

센테라이트정은 식물성분인 센텔라아시아티카 (Centella asiatica) 정량 추출물을 주성분으로 하는 정맥질환 개선제입니다.

특 장 점

센텔라아시아티카 정량 추출물은

1. 정맥 탄력성을 조절하는 플라겐의 합성을 증가시킵니다.
2. 모세혈관 투과성을 개선시켜 다리의 부기, 무거움, 통증등의 증상을 개선시켜 줍니다.
3. 항산화 작용으로 세포를 보호하고 염증을 완화시켜 줍니다.

효능·효과



하지둔중감
(다리가 무거움 느낌)



통증(아픔)



하지불온증상
(다리가 불편한 느낌)

원료약품 및 그 분량 - 1정 중 -

- 유효성분 : 센텔라정량추출물(아시아티코시드로서12mg, 총 게닌으로서18mg)(생규) 30mg
- 첨가제(타르색소) : 황색203호 알루미눔레이크, 청색2호 알루미눔레이크, 청색1호 알루미눔레이크
- 기타 첨가제 : 규화미결정셀룰로오스, 스타캡1500, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 콜로이드성아산화규소

효능·효과

정맥질환 : 정맥, 림프 부전과 관련된 증상의 개선(하지둔중감, 통증, 하지불온증상)

용법·용량 성인 1일 1~2정, 식사와 함께 복용하십시오.

성 상 연두색의 원형 필름 코팅정

사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응의 병력이 있는 환자
 - 2) 임신부, 수유부, 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 또는 임신할 계획이 있는 여성
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 드물게 구토, 식욕부진 등이 나타날 경우
 - 2) 드물게 알러지 반응이 나타날 경우
 - 3) 드물게 가려움과 광민반응(햇빛에 의한 피부 민감성이 높아져 발적, 발진 발생)이 나타날 경우
3. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 권장 복용량 이상 복용하지 마십시오.
 - 2) 단기간만 사용하고 질환이 재발하거나, 최근에 증상의 변화를 인지한 경우 의사 또는 약사와 상의하십시오.

⚠ 저장상의 주의사항



1 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오



2 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.



3 포장지에 표기된 사용기간(한)이 지난 후에는 사용하지 마십시오.

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 포장단위 60정(10정/PTP) X 6, 100정(10정/PTP) X 10, 120정(10정/PTP) X 12

사용기간 제조일로부터 36개월

※ 내부 포장에 파손되어 있으면 복용하지 마십시오.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지난거나 변질·변패·오염되었거나 손상된 의약품은 공정거래위원회고시(소비자 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

제조사 동림무약(주) / 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 120

제조회회사 (주)대웅제약 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-14



대웅제약