

디카본100정

원문·의약품
등록번호: 1293

【원료약품의 분량】1정 중

배합목적	원료명	활성물질용량	규격	분량	단위
주성분	탄산칼슘	칼슘으로 100 mg	NF	250	밀리그램
주성분	농축콜레칼시페롤(분말형)	콜레칼시페롤로서 1,000 IU	EP	10	밀리그램
착색제	황색 203호(알루미늄레이크)		KPTaCS	1	밀리그램
착색제	청색 1호(알루미늄레이크)		KPTaCS	0.065	밀리그램

【성상】녹색의 장방형 필름코팅정

【용법·용량】성인 및 만 8세 이상 어린이：1일 1회 1정을 복용

【효능·효과】

다음 경우의 비타민 D의 보급

- 임신·수유기, 발육기, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 뼈, 이의 발육불량
 - 구루병의 예방

【저장방법】밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 과칼슘혈증(hypercalcaemia: 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
 - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 4) 신장결석 환자
 - 5) 심한증상의 신부전 환자
 - 6) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
 - 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 4) 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
 - 5) 심장·순환기계 기능 장애 환자
 - 6) 신장장애 환자
 - 7) 저단백증 환자
 - 8) 강심배당체를 투여 중인 환자
 - 9) 신장결석 병력이 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우.
 - 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진
 - 2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 3) 장기 투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
- 4) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
 - 5) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
 - 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용전후에는 피할 것.
- 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
 - 3) 오염(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.