

디카본500정

인공위약
등록번호: 120

【원료약품의 분량】1정 중

배합목적	원료명	활성물질용량	규격	분량	단위
주성분	탄산칼슘	칼슘으로 500 mg	NF	1250	밀리그램
주성분	농축콜레칼시페롤(분말형)	콜레칼시페롤로서 1,000 IU	EP	10	밀리그램
착색제	황색 203호(알루미늄레이크)		KPTaCS	2.8	밀리그램
착색제	청색 1호(알루미늄레이크)		KPTaCS	0.182	밀리그램

【성상】녹색의 장방형 필름코팅정

【용법·용량】성인 및 만 8세 이상 어린이 : 1일 1회 1정을 복용

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민 D의 보급
 - 임신·수유기, 발육기, 노년기
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 뼈, 이의 발육불량
 - 구루병의 예방
- 칼슘 결핍 및 기타 칼슘 보급

【저장방법】밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 과칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 신장결석 환자
 - 심한증상의 신부전 환자
 - 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 다음과 같은 사람(경우는 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것).
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
 - 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
 - 심장·순환기계 기능 장애 환자
 - 신장장애 환자
 - 저단백증 환자
 - 강심배당체를 투여 중인 환자
 - 신장결석 병력이 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우.
 - 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진
 - 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 장기 투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
 - 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
 - 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
 - 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
 - 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용전후에는 피할 것.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
 - 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.