



동전크기로 간편하게

제놀코인

플라스타



실제크기와 동일함
2.8cm
동전모양

42매입

관절통

류마티스
통증

신경통

어깨
걸림

사용 후 접어서 보관하세요.

사용 후 접어서 보관하세요.

동전크기로 간편하게

제놀코인

플라스타

관절통

류마티스
통증

신경통

어깨
걸림

일반의약품

분류번호 264

일반의약품 정보

[유효성분] 1매 (원지름 28mm, 0.2832g) 중
d-칼파 (K₁) 1.108 mg, d-판톨 (K₂) 2.769 mg, 노닐산비닐피리드 (헬구) 0.046 mg,
디벤히드라민 (K₃) 0.246 mg, 박하유 (멘톨로서) 0.21mg (K₄) 0.693 mg, 살리실산메틸
(K₅) 5.541 mg, 토포페롤아세테이트 (K₆) 0.308 mg

[효능·효과] 다음 증상의 진통·소염·항염·다발성 췌관염, 근육통, 관절통, 요하리통,
어깨걸림, 신경통, 류마티스통증

[용법·용량] 1일 1~수매를 환부(질환 부위)에 적당히 붙입니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자(부위)에는 투여하지 마십시오.
1) 3개월 이하의 유아 2) 습진, 물집, 알레르기성 피부염, 상처 부위
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
1) 지금까지 약이나 화장품 등에 알레르기 증상을 일으킨 발진, 발적, 가려움, 붓음, 옷 등에 알레르기 반응이 나타난 적이 있는 환자 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 환자 3) 습진(습기)이나 피부염(물집)이 심한 환자 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자 5) 소아(경험을 유할 수 없음)
3. 주의
1) 이 약의 사용으로 인해 발진, 발적, 가려움, 발적, 가려움 등의 증상이 나타나는 경우에는 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다. 2) 이 약의 사용으로 인해 때때로 심한 가려움이나 통증이 나타나는 경우에는 사용을 중지합니다.

4. 일반적 주의
1) 정해진 용법, 용량을 잘 지켜주세요. 2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 사용합니다. 3) 5~6세 이하의 어린이도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
5. 적용상의 주의
1) 이 약은 의용으로만 사용합니다. 2) 환부(질환 부위)가 범용으로 젖은 경우는 잘라내고 사용합니다. 3) 천부(천부) 부위를 흐린나 잔기(모로) 피로하게 하지 않습니다. 4) 이 약을 붙이고 목욕 할 때는 강한 자극을 느끼기 때문에 입욕 30분~1시간 전에 떼고 목욕합니다.
6. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. 2) 직사광선을 피하고 물이 닿으면 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하여 보관합니다. 3) 오염된 손을 씻고 물자의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 42매

[사용기한] 제품 뒷면 하단 표시일까지

[첨가제] 기타 첨가제: 부직포, 부틸레이드티드록시콜루엔, 수소첨가 C6-20폴리올레핀, 스티렌이소프렌스티렌복합중합체, 유동파라핀, 폴리메틸렌테트라프틸레이트 세페라이트, 폴리소부틸렌

[성상] 이 약은 빈투명한 점착성 물질을 부직포에 도포한 동근원 모양의 첩부제입니다.

[제조사] 대화학(주) 강원도 횡성읍 횡성로 495

- * 부작용 보고 : 한국약리물안전관리원(1644-6223)
- * 통풍이 있는 환부위에 여러장을 동시에 붙여 사용하지 마십시오.
- * 이 제품은 공장(대화학) 고지 소비자(대화학) 7곳에 따라 소비자(대화학)의 정당한 피해는 보상 받을 수 있습니다. 구입시 사용기한 또는 유효기간이 지나거나 변질, 변색, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 상기 표시 사항 중 작성일자(2018년 5월 16일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.greencross.com)나 소비자상담실(020-260-0033)로 문의하시기 바랍니다.

[안전한 사용방법]

1. 사용 전에 살균수를 세척하여 마르고 건조한 후 사용하십시오.
2. 피부에 붙이기 전에 피부 또는 옷에 붙이지 마십시오.
3. 피부 알레르기 반응을 위하여 알레르기 반응이 없는 피부에 붙여 보십시오.
4. 내장 장구 사용 중 환부를 흐린나 잔기(모로) 피로하게 하지 않습니다.
5. 피부, 문질러 전후에는 피부(피부)에 자극이 없도록 주의하십시오.
6. 피부 이상 증상이 생겼을 때에는 끊거나 손질하지 말고 즉시 의사 또는 약사와 상의하십시오.



OTHER

호환-10-4109-2

제조번호 :

사용기한 :



GC녹십자
[주] 녹십자
서울 양천구 신정로 28
TEL 02-666-9000
소재지(서울) TEL 020-260-0033