

정맥순환개선제

**센탈라<sup>정</sup>**

(센탈라정량추출물)

일반의약품

약효분류 : 490 기타의 조직세포의 기능증진약

**정맥, 림프 부전과 관련된 증상의 개선**

- 센탈라정의 주성분인 센탈라정량추출물은 정맥의 탄력 향상<sup>1),2),3)</sup>과 모세혈관 투과성 정상화<sup>4),5)</sup>, 항산화 효과<sup>6)</sup> 등을 통해 정맥순환장애를 개선시켜 줍니다.
- 센탈라정은 정맥, 림프 부전과 관련된 증상인 하지(다리)둔중감, 통증, 하지(다리)불온(불안감)증상 개선에 효능·효과가 있습니다.

Reference :

- 1) Connect Tissue Res, 1990;24(2):107-120    2) Ital J Biochem 1988;37:69-77    3) Int.J Clin Pharm. Res, 1990;4:229-233  
4) Angiology 1990;41:533-540    5) Angiology 2001;52(Suppl 2):S49-S54    6) Phytother Res 1999; 13:50-54

**[원료약품 및 그 분량] 1정 중**

센탈라정량추출물(생규) ..... 30mg

(아시아티코시드로서 12mg, 총 계년으로서 18mg)

첨가제(타르색소) : 황색203호, 청색2호, 청색1호

**[성상]** 연두색의 원형 필름코팅정**[효능·효과]** 정맥질환 : 정맥, 림프 부전과 관련된 증상의 개선(하지(다리)둔중감, 통증, 하지(다리)불온(불안감)증상)**[용법·용량]** 성인 : 1일 1~2정, 식사와 함께 복용한다.**[사용상 주의사항]**

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
  - 이 약 및 이 약의 구성 성분에 과민반응의 병력이 있는 환자
  - 임산부, 수유부, 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 또는 임신할 계획이 있는 여성
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.  
다른 의약품을 복용하고 있을 경우
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.  
상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
  - 드물게 구토, 식욕부진 등이 나타날 경우
  - 드물게 알러지 반응이 나타날 경우
  - 드물게 가려움과 광과민반응(햇볕에 의한 피부 민감성이 높아져 발적(충혈되어 붉어짐), 발진 발생)이 나타날 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
  - 권장 복용량 이상 복용하지 말 것.
  - 단기간만 사용할 것. 질환이 재발하거나, 최근에 증상의 변화를 인지한 경우 의사 또는 약사와 상의할 것.
- 저장상의 주의사항
  - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
  - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
  - 포장지에 표기된 사용기간이 지난 후에는 사용하지 말 것

**[저장방법]** 기밀용기, 실온보관(1~30℃)**[포장단위]** 60정(10정/PTPX6), 100정(10정/PTPX10)※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr> → 의약품유해사례보고)에 알리도록 하십시오.※ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보 참조

※ 만일, 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.

**부광약품주식회사**

제조외래지 : 부광약품(주) 경기도 안산시 단원구 능안로 47  
 제조자 : 동림무약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 120

개정년월일 : 2017.06.23

♣ 소비자 상담실 : TEL 080-933-2233

<http://www.bukwang.co.kr>