

엄마와 아기를 위한 천연색소 폴산(엽산)제 **폴레디정** (폴산)

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

폴산(KP) 1.0 밀리그램

첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

[성상] 노란색의 원형 정제

[효능·효과]

1. 폴산결핍증의 예방 및 치료

2. 폴산의 수요가 증대하여 식사로부터 섭취가 불충분한 경우의 보급 : 소모성 질환, 임부 · 수유부

3. 악성빈혈의 보조요법(비타민 B₁₂ 결핍으로 인한 빈혈 제외)

4. 다음 질환 중 폴산의 결핍 또는 대사장애가 관여한다고 추정되는 경우

1) 영양결핍성빈혈, 임신성빈혈, 소아빈혈

2) 항전간제, 항말라리아제 투여로 인한 빈혈

5. 알콜중독 및 간질환에 관련된 거대적아구성빈혈

[용법·용량]

1. 폴산결핍증, 다른 약물 투여로 인한 결핍증 치료

성인 및 어린이 : 폴산으로서 1일 0.25 ~ 1 mg을 복용합니다.

2. 폴산결핍증 예방 및 폴산의 요구량이 증대하는 각종 질환

성인 및 어린이 : 이 약으로서 1일 0.1 ~ 0.25 mg을 복용합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

1) 이 약 또는 이 약에 포함된 성분들의 과민반응 환자

2) 비타민 B₁₂ 결핍으로 인한 악성빈혈 또는 거대적아구성빈혈

3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2) 악성빈혈 환자(투여 시, 혈액상태는 개선되나 신경증상에는 효과가 없으므로 비타민 B₁₂ 제제를 병용(함께 사용)하십시오. 단, 진단이 확립되지 않는 악성빈혈 환자의 경우 혈액상태의 개선에 의해 악성빈혈을 은폐하여 진단 및 치료에 영향을 줄 수 있으므로 주의하십시오.)

3) 아미노살리실산, 경구용 피임제, 디하이드로폴레이트 환원효소 저해제(메토티렉세이트, 트리메토프림 등)를 복용 중인 환자(바람직하지 않는 상호작용을 초래할 수 있습니다.)

4) 페니토인 같은 히단토인계 항전간제를 복용 중인 환자(페니토인의 혈중농도를 감소시켜 발작빈도를 증가시킬 수 있습니다.)

5) 설파살라진, 콜레스티라민을 복용 중인 환자(이 약의 위장관 흡수를 저해할 수 있습니다.)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오, 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

1) 홍반(붉은 반점), 피부발진, 가려움증, 전신권태, 호흡곤란 등의 알레르기 증상

2) 식욕부진, 구역 · 구토, 부종(부기), 체중감소

3) 위장관장애, 수면변화, 집중부족, 과잉행동, 과민성, 흥분, 우울증, 혼란, 판단력 장애 등의 중추신경장애(고용량(1일 15 mg 이상)에서 나타날 수 있습니다.)

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.

2) 어린이에게 투여할 경우 보호자의 지도 · 감독 하에 투여하십시오.

3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관하십시오.

3) 오용(잘못 사용)·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1-30℃)보관

[포장단위] 15정, 30정

[제조회사] 에이프로젠제약(주) / 경기도 화성시 양감면 두머리길 16

[제 조 자] (주)마더스제약 / 경북 경산시 진량읍 공단6로24길 18

[판 매 자] (주)대웅생명과학 / 서울시 송파구 삼전로 42

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오.

* 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.

* 이 첨부문서 작성일자(2017년 07월 07일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.

* 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

첨부문서 최종 개정연월일 : 2017.07.07

☎ 소비자 상담실 (02)561-4011

1707-00