GC 녹십자

근육통과 관절통을 한번에

제놀 더블액션

카타플라스마



관절통 근육통 허리통증 삠

7매입

일체형
4방향 신축성

떼실때

포장을 뜯어서 밀폐하여 보관하시오.

126.52

15

15

떼실때

포장을 뜯어서 밀폐하여 주십시오.

근육통과 관절통을 한번에

제놀 더블액션

카타플라스마

관절통 근육통 허리통증 삠

일반의약품
분류번호 264

일반의약품 정보

[유효성분] 1매 (10 X 7㎝, 1433㎎) 중

dl-캄피(KP)	70 mg
l-멘톨(KP)	56 mg
노닐산바닐릴아미드(볼규)	0.168 mg
살리실산메틸(KP)	42 mg

[효능·효과] 다음 증상의 진통·소염(항염) : 타박상, 삠, 요(허리)통, 어깨결림, 근육통, 관절통

[용법·용량] 약면의 박리(벗)지를 벗기고 1일 1~3회 환부(질환부위)에 붙입니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자(부위)에는 투여하지 마십시오.
1) 30개월 이하의 유아 2) 습진, 옻 등에 의한 피부염 상처부위

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
1) 지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(약물 등만 발진·발적(충혈)되어 붉어짐, 가려움, 옻 등에 의한 피부염 등이 나타난 적이 있는 환자 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 환자 3) 습윤요기 환자나 미런것도둠이 상한 환자 4) 의사와 치료를 받고 있는 환자 5) 소아(갓난아 은 없습니다.)

3. 부작용
1) 이 약의 사용으로 인해 발진·발적(충혈되), 붉어짐, 가려움 등의 증상이 나타나는 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의합니다. 2) 이 약의 사용으로 인해 매우 드물게 가려움이나 통증이 나타나는 경우에는 사용을 중지합니다.

4. 일반적 주의
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다. 2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 사용합니다. 3) 5~6일간 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의합니다.

5. 적용상의 주의
1) 이 약은 외용으로만 사용합니다. 2) 첨부된 설명서를 확인 후 사용합니다.

6. 저장상의 주의사항
1) 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀폐하여 보관합니다. 3) 오염되면 사용을 삼고 흡입의 보존을 위해서 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관 (1~30℃)

[포장단위] 7매

[사용기한] 제품 뒷면 하단 표시일까지

[참가제] ·기타 참가제 : 감초모과추, 능금리세린, 라바렉스, 박리지 부직포, 부틸하드록시톨루엔, 산화이먼, 산화티탄, 수소첨가 C6-20 폴리올레핀, 유동파라핀, 이소프로필미리스테이트, 정제수, 카올린, 폴리부텐, 폴리소르베이트 80, 폴리아크릴산나트륨, 합성고무에스테르라텍스

[성상] 미황(연노랑)백색~황백색의 고체를 부직포에 도포(바름)하여 고체면에 박리벗겨짐지를 덮은 것으로 특이한 냄새가 있는 카타플라스마제입니다.

[제조자] 대화제약 (주) 강원도 횡성군 횡성읍 한우로 495

※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)
※ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따라 소비자의 정당한 피해는 보상받을 수 있습니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
※ 상기 표시 사항 중 작성일자(2018년 5월 16일)이후 변경된 내용은 홈페이지 (www.greencross.com)나 소비자상담실(080-260-0033)로 문의하시기 바랍니다.

[올바른 사용방법]
- 사용 전에 설명서를 상세히 읽어 보시고 효능, 효과상에 기재된 용도 이외에 임의대로 제품을 부착하지 마십시오.
- 질환부위를 깨끗이 하고 건조상태에서 부착하십시오.
- 목과 같이 연약한 부위나 피부 또는 면에이 많은 부위에 부착한 경우에는 미온수로 적당히 불려서 떼어 내십시오.
- 피부 일부지 탈지면 위에 동일부위에 연속적으로 사용하는 것은 피해 주시고 기타증상이나 발적, 발진이 나타날 경우 사용을 중지하고, 병부를 흐르는 찬물에 담가 주십시오.
- 사우나, 온천실 전에는 피부감염이 악화되고 내피가 손상되기 쉬우므로 본 제품 부착 시 주의하십시오.
- 피부에 이상 증상이 생겼을 때에는 긁거나 손대지 말고 즉시 의사 또는 약사와 상담하십시오.

제조의뢰 및 판매자

GC 녹십자

(주) 녹십자
충북 음성군 금왕읍 무극로65번길 26
TEL. 031)230-9300
소비자상담실 TEL. 080-260-0033



호일-10-4030-2

제조번호 :
사용기한 :

8 806436 054714