

일반의약품

분류번호 319
(기타의 비타민제)

마그넘액티브^{연질캡슐}

원료약품 및 분량 (1캡슐중)

- 유효성분 : 토코페롤아세테이트 (비타민E로서 500IU) (KP) 500mg
산화마그네슘 (마그네슘으로서 150.8mg) (KP) 250mg
푸르셀티아민 (KP)..... 50mg
피리독신염산염 (KP)..... 50mg
시아노코발라민 (KP)..... 500μg
감마오리자놀 (KP)..... 5mg

- 기타 첨가제 : 농글리세린, 레시틴, 백랍, 산화철, 소르비톨엑(비결정성), 숙신산젤라틴, 에틸바닐린, 중쇄트리글리세리드, 카르나우바납, 공기름

성상 : 연한 분홍색의 점조성 내용물을 함유한 적갈색의 장방형 연질캡슐

ID Mg

효능 · 효과

- 다음 경우의 **비타민 E, B₁, B₆**의 보급
 - 육체피로
 - 임신 · 수유기
 - 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
 - 노년기
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.
- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 :
어깨 · 목결림, 수족저림 · 수족냉증(손발이 차가움)
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등),
구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 각기
- 눈의 피로
- 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

용법 · 용량

만 12세 이상 및 성인 : 1회 1캡슐, 1일 2회 복용합니다.

사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
(1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 (2) 만 12개월 미만의 젖먹이
(3) 심한 증상의 신부전 환자 (4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
(5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
(1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
(2) 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
(1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 (2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 (3) 심장 · 순환기계기능 장애 환자 (4) 신장(콩팥)장애 환자 (5) 저단백혈증 환자 (6) 임부 (7) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

※마그넘-1170810

- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 구내염(입안염), 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
- (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- (3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- (4) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- (5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- (6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- (7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- (8) 우발적으로 과량복용 한 경우
- (9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
- (2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
- (3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

60, 120캡슐

- 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
- 이 설명서는 2017년 8월 10일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.
- 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

제조사 : (주)서흥 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

제조의뢰자

일동제약주식회사

본사 : 서울특별시 서초구 바우포로27길 2

공장 : 경기도 안성시 공단로 25

소비자상담실 : (전화)080-022-1010

※마그넘-1170810

ILDONG

ILDONG