

목감기 걸린 그날엔 **그날엔® 코프 플러스** 연질캡슐

【성분·함량】1캡슐 중
아세트아미노펜(KP)..... 200mg
클로페라스틴염산염(JP)..... 8mg
노스카핀염산염수화물(KP)..... 5mg
■첨가제 : 솔비톨스페살글리세린볼렌드, 정제수, 젤라틴, 치차청색소, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜400, 프로필렌글리콜, 홍화황색소

【성상】연노랑 내지 연한 녹색의 투명한 내용물을 함유한 녹색의 투명한 장방형 연질캡슐

【효능·효과】감기의 증상(인후통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【용법·용량】만 15세 이상 및 성인 : 1회 2캡슐을 1일 3회, 식후 30분에 복용

【사용상의 주의사항】

1. **경고**
매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1)이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
2)이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
3)만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
4)MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
진해(기침을 그치게 함)제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항스타틴제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구제, 멸미약, 알레르기 약)

4. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것.

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
1)이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 어지러움
2)이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한 증상) 증상이 나타난 경우
①속(아나필락시) : 복용 후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
②피부점막안종후군(스티븐스-존슨증후군), 중증성표피괴사증후군(리얼증후군) : 고열을 동반하고, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있다.
③천식
④간기능장애 : 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨)등이 나타날 수 있다.
⑤간질성폐렴 : 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다.
3)5 ~ 6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
1)정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
2)장기간 계속 복용하지 말 것.
3)복용시에는 음주하지 말 것.
4)바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 대량의 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.

8. 저장상의 주의사항
1)어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
2)직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
3)오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】10캡슐/PTP×1

이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다.

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1)수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것.)
2)만 3개월 미만의 영아(갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영·유아(갓난아기)는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영·유아(갓난아기)에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다.
3)본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
4)지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
5)간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장궤양, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
6)속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 게양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
7)임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
8)의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
9)다음과 같은 기침이 있는 사람
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

※ 본 제품은 우수약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여 엄격한 품질관리를 완료한 제품입니다. 사용기한이 지났거나 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품이 있으면 사용하지 마시고, 구입한 약국이나 담당 영업소에서 교환하시기 바랍니다.
※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하시기 바랍니다.
※ 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우, 의사나 약사 또는 한국약품안전관리원(drugsafe.or.kr→의약품 유통사례보고)에 알리시기 바랍니다.
※ 제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
※ 의약품을 사용하기 전에 사용자에게는 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다. 이 약의 올바른 복용법을 모르거나 이 약 및 질병에 대한 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.
*이 첨부문서 개정일(17년 7월) 이후 변경된 내용은 www.kdpharma.co.kr나 02-576-6121, 3에서 확인할 수 있으며, 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품서관(http://drug.mfds.go.kr)을 참조하시기 바랍니다.

제조사 : (주)알파바이오
공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7

제조의뢰 · 판매원 : 경동제약(주)
공장 : 경기도 화성시 양감면 제약단지로 224-3

소비자상담실 전화번호 : (02) 576-6121, 3

 **경동제약주식회사**