

일반의약품
분류번호: 03190

근육경련 혈액순환 개선제

투엑스비엠

연질
캡슐

근육경련
혈액순환



손발저림
어깨목결림

■ 원료약품 및 그 분량

토코페롤아세이트(KP) 500 mg	1캡슐 (1,615 mg) 중
(비타민D로서 500IU)	
산화마그네슘(KP) 250 mg	
(마그네슘으로서 150.78 mg)	
피리독살린산염(USP) 40 mg	
티아민질산염(KP) 30 mg	
벤포티아민(KP) 20 mg	
(티아민염산염으로서 14.46 mg)	
니코틴산아미드(BP) 10 mg	
농축콜레칼시페롤(유상)(BP) 0.5 mg	
(비타민D로서 500 IU)	
감마오리자놀(KP) 10 mg	
착색제(타르색소) : 적색40호, 황색5호, 청색1호	

【성상】 회백색의 유상 내용물을 함유한 적갈색의 장방형 연질캡슐

【용법용량】 만 12세 이상 및 성인 1일 2회, 1회 1캡슐 복용

【효능효과】 1. 다음 경우의 비타민 D, E, B₁, B₆ 의 보급
- 육체피로, 임신수유기, 병중병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하, 발육기, 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
- 말초혈행장애 및 경련기시 다음 증상의 완화: 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
- 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염),
구순염(입술염), 구내염(입안염), 실염(혀염), 습진, 피부염
- 각기, 눈의피로 - 마그네슘결핍으로 인한 근육경련
- 뼈, 이의 발육불량 - 구루병의 예방

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장단위】 60캡슐(10캡슐/PTP X 6), 120캡슐(60캡슐 X 2EA)

【판매원】 제일헬스사이언스 / 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로7

【제조원】 코스맥스바이오(주) / 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30

【소비자 상담실】 080-549-0002 (반품 및 교환처: 구입처)

【사용기간】 제조일로부터 24개월

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

1) 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 3) 만 12개월 미만의 젖먹이 4) 신장결석 환자 5) 심한 증상의 신부전 환자 6) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 7) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 ①비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다 3) 심장·순환기계기능 장애 환자 4) 신장장애 환자 5) 저단백혈증 환자 6) 임부 7) 신장결석 병력이 있는 환자 8) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체지방증 등 지질대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자 9) 이 약은 황색5호(섀넬로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은 변, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 티아민 D를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다. 4) 피리독살린 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다 6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 7) 항알도스테론제, 트라마데렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. 8) 우발적으로 과량복용한 경우 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용후에는 피할 것. 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여드립니다.

※ 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.

※ 의약품 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 설명서 작성일자(2017년 09월) 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

설명서 작성일: 2017년 9월