

- ※ 이 약을 사용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어주시요.
- ※ 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어주시요.
- ※ 사용기한이 지난 약품은 사용하지 마십시오.

▶ 사용설명서 ▶

슈리베르 액상 코캅가약

솔루산 노프 연질 캡슐

천식약제로 제1회 우수 의약품상 수상(2013년)
소아과 전문의 추천 의약품

분류번호

114

일반의약품

KGMP

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(1,190mg) 중	
아세트아미노펜(KP)	200.0mg
슈도에페드린염산염(USP)	15.0mg
클로르페니라민말레이트(KP)	1.25mg
정기제(트라스크스) : 황색203호, 창색1호	
[성 성] 미황색 타지 연색의 투명한 액이 든 연한 녹색의 투명한 정방형 연질캡슐	
[효능·효과] 감기의 계통상(여러종상)(코골, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 오한(고열과 열리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화	
[용법·용량] 만 15세 이상 및 성인: 1일 3회, 1회 2캡슐씩 수 30분에 복용	
[사용상의 주의사항]	

1. 경고
매일 세찬 아침 정식으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사와의 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 찬술을 일으킨 적이 있는 사람
3) 만 3개월 미만의 영아(간단히)

3. MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

3. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 약을 복용하지 말 것.
진해제(기침을 그치게 함)가(가)제(가)제, 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(면역(코)염증, 경구, 말미, 알레르기)를 함.

4. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것.
1) 수도 또는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제형과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간 손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제형과 함께 복용해서는 안 된다.

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
1) 수도 또는 인공두뇌(간)에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(간단히) 및 만 15세 미만의 어린이(구역)나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이쉴러증의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것.)
2) 만 3개월 미만의 영아(간단히)에게는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영아(간단히), 유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 그 필요할 경우 아니면 이 약을 복용하지 않아도 된다. 만 2세 미만 영아(간단히), 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다.
3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지 천식, 알레르기성 비염(코), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키는 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
5) 간질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위암(위장암), 뇌내강막(예: 뇌의 통증, 눈이 침침함 등), 폐노(소변을) 남(남) 등이 있는 사람, 고령자(노년), 몸이 약한 사람 또는 고령이 있는 사람
6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장 문제가 지속 혹은 재발되거나 재, 출혈성 문제를 가지고 있는 사람
7) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
8) 의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨병, 통풍, 관절염, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
9) 다음과 같은 기침이 있는 사람

출연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 기침이 동반되는 기침, 1주 이상 지속되는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열, 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타날 경우
발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 배노(소변을) 남(남), 목다름(지속적이거나 심한), 어지러움, 불안, 떨림, 불면
2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 증상(심한 증상) 증상이 나타날 경우
① 속(아·복막)시(과민성 쇼크): 복통 후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
② 피부부종(인공두뇌(간)스틴스-존슨증후군), 중독성표피괴사증후군(리엘증후군): 고열을 동반하고, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신 피부, 입이나 눈경막에 나타날 수 있다.
③ 천식
④ 간기능장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨) 등이 나타날 수 있다.
⑤ 간질환(예: 기침을 동반하고 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타남).
3) 5-6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
7. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
2) 정기간 계속 복용하지 말 것.
3) 복용시에는 음주하지 말 것.
4) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
5) 바르르하게 약을, 심한 경우 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 다시 사시는 능력에 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.
8. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
2) 직사광선을 피하고 빛을 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.
[저장방법] 기밀용기, 실온(10~30도) 보관
[포장방법] 10캡슐
※ 이 약은 물과 함께 복용하십시오.
※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
※ 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움)이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 약사는 의사와 상의하십시오.
※ 오용(잘못 사용)을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣어 사용하지 않습니다.
※ 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
※ 이 제품의 내용에 대한 문헌은 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문헌으로 문헌하십시오.
※ 이 사용설명서 개정(2017년 07월) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지(<http://www.hyundapharm.co.kr>)나 제품문헌의 ☎ 1666-9979에서 확인하실 수 있습니다.

[제조/외지] 현대약품주식회사
충청남도 천안시 동남구 공서정 천리길 55
[제조/지] 코스맥스바이오주식회사
충청북도 제천시 바이오밸리3로 30

☎ 제품문의처 : 1666-9979
사용설명서 개정년월 : 2017.07

