

※ 이 약을 사용하기 전에 사용설명서를 자세히 읽어주십시오.
 ※ 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어주십시오.
 ※ 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.



승려베르 맥스 기립각기약

슬루샷 코프

여성
건강
답답

분류번호

114

일반약물

KGMP

[원료약품 및 그 분량] 1합술(1,190mg) 중	
아세트아미노펜(KP)	200.0mg
구아니페신(KP)	41.6mg
덱스트로메토르판비루화수산화수화물(KP)(비고: 일수화물)	8.0mg
다메탈메르덴염산염(KP)	12.5mg

참가제(테르소스): 적색40호, 청색1호

[성상] 미향색 내지 연한 청색의 투명한 액이 든 청색 투명한 장방형 연질정

[효능·효과] 감기의 증상(여러 증상), 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(열)과 더불어는 증상, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

[용법·용량] 15세 이상 및 성인: 1일 3회, 1회 2정씩 식후 30분에 복용

[사용상의 주의사항]

1. 경고

매일 새장 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
- 만 3개월 미만의 영아(신생아)
- MAO제제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

알코올(주류), 기타제(가래제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염)(코염)을 경구제, 멸미약, 알레르기(음약)

4. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것.

- 이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간 손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다.

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(신생아)가 및 만 15세 미만의 어린이(구약이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이중후군)의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것.)
- 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위산과제제(위산 억제제) 등을 복용하고 있는 사람
- 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 레광, 술흔들거름을 가지고 있는 사람
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨병, 통풍, 관절염, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 다음과 같은 기침이 있는 사람
 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 기침이 동반되는 기침, 1주 이상 지속되는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타나는 경우
 발진·발적(홍혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 어지러움, 불안, 떨림, 불면
- 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한 증상) 증상이 나타나는 경우
 ① 속(가슴)마르시(과민성 쇼크): 복통후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함과 함께 안색이 창백해지고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
 ② 피부경막안충출(스티븐스-존슨증후군), 충독성표피괴사증후군(레일증후군): 고열을 동반하고, 발진·발적(홍혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있다.
 ③ 천식
 ④ 간기능장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨) 등이 나타날 수 있다.
 ⑤ 간질성폐렴: 기침을 동반하고 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다.

3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

7. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 장배진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 장기간 계속 복용하지 말 것.
- 복용시에는 음주하지 말 것.
- 복복발열에 약을, 삼한계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 다시시키는 능력에 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.

8. 저장상의 주의사항

- 아린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
- 직사광선을 피하고 필수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보증을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장방법] 10합술

※ 이 약은 물과 함께 복용하십시오.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.

※ 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 발적(홍혈되어 붉어짐), 가려움)이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.

※ 오용(잘못 사용)을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣어 사용하지 않습니다.

※ 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 제품의 내용에 대한 문은 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의로 처리 문의하십시오.

※ 이 사용설명서 개정년월(2017년 07월) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지(<http://www.hyundaipharm.co.kr>)나 제품문의로
 ☎ 1666-9979에 확인하실 수 있습니다.

[제조·회차] 현대약품주식회사 **☎ 제품문의처: 1666-9979**

충청남도 천안시 동남구 종재천 다리길 55 **사용설명서 개정년월: 2017.07**

[제조지] 코스텍스바이오주식회사

충청북도 계천시 바이오밸리3로 30

