

- * 이 약을 사용하기 전에 사용설명서를 자세히 읽어주시시오.
- * 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어주시시오.
- * 사용기한이 지난 제품은 사용하지 않습니다.

사생활보호

CCM

최대 100% 할인 혜택

효리베는 액상 종합감기약

슬루샷 쿨

여진
캐슬

분류번호

114

일반의약품

KGMP

원료약품 및 그 분량 1슬루(1,280mg) 중	
아세트아미노펜(KP)	200.0mg
구아니페딘(KP)	41.6mg
슈도에피드린염산염(KSP)	15.0mg
엑스트라에도르반브로모수산화물(KP)(비고: 일수화물)	8.0mg
클로르페니라민말레산염(KP)	1.25mg
d-메틸에피드린염산염(KP)	6.25mg

참가제(테트라소스): 적색40호, 청색1호

성 성 성 미향색 및 연한 적색의 투명한 액이 든 적색 투명한 장방형 연질캡슐

【효능·효과】 감기의 증상(여러증상): 콧물, 고막염, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(출고 열리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통 등의 완화

【용법·용량】 성인 15세 이상 및 성인: 1일 3회, 1회 2스푼씩 식후 30분에 복용

【사용상의 주의사항】

1. 경고

매일 세안 이상 정기적으로 손을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사의 약사의 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
 - 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 간손상을 일으킨 적이 있는 사람
 - 3) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
 - 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등을)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
- 간헐기침을 치료하기 위한 기침약(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염, 코염)을 경구제, 멸미약, 알레르기약
4. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것
- 1) 이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제형과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간 손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제형과 함께 복용해서는 안 된다.

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것
- 1) 수두 또는 다른 인플루엔자 감염되어 있거나 또는 의심되는 병이(갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구약이나 구토를 수반하는 행동의 변화)가 있다면, 드물지만 심각한 장염인 레지온균의 초기 증상을 일으킬 수 있으므로 의사와 상의할 것
 - 2) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지염, 알레르기성 비염, 결막염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 3) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상에: 발열, 발진, 관절통, 전신, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람
 - 4) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위암/위장암, 녹내장(눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을) 곤란 등이 있는 사람, 고령자(노년), 몸이 약한 사람 또는 고령이 있는 사람
 - 5) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 재감, 출혈문제를 가지고 있는 사람
 - 6) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 7) 의사와 의사와의 치료를 받고 있는 사람(당뇨, 통풍, 관절염, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
 - 8) 다음과 같은 기침이 있는 사람
- 출연, 전신, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열-발진이나 지속적인 등통이 동반되는 기침

6. 다음과 같은 경우는 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 - 발진·발적(홍당류)이 붉어짐, 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 배뇨(소변을) 곤란, 목부종(지속적이거나 심한), 어지러움, 불안, 떨림, 현훈
 - 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한 증상) 증상이 나타난 경우
 - ① 속(내)과(위장)과(신장) 소근: 복통 후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴압박감과 함께 안색이 창백하고, 소변이 적고, 식욕부진, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
 - ② 피부과(피부)와(신장) 소근(스티븐스-존슨 증후군), 중독성표피괴사증후군(리델 증후군): 고열을 동반하고, 발진·발적(홍당류)이 붉어짐, 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신 피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있다.
 - ③ 전신
 - ④ 간기능장애: 전신의 나른함, 황달(마른 또는 높은 흰색의 황색을 띠는 피부) 등이 나타날 수 있다.
 - ⑤ 간질성비염: 기침을 동반하고 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다.
 - 3) 5-6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
7. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
- 1) 장해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 장기간 계속 복용하지 말 것.
 - 3) 복용 시에는 음주하지 말 것.
 - 4) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
 - 5) 비부비탈계 약물, 산한계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.
8. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 빛을 받는 한 습기가 적은 곳(에어컨방)에 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보증을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.
- 【저장방법】** 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관
- 【포장단위】** 10스푼
- * 이 약은 물과 함께 복용하십시오.
- * 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- * 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 발적(홍당류)이 붉어짐, 가려움)이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 약 또는 의사와 상의하십시오.
- * 오용(잘못 사용)을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣어 사용하지 않습니다.
- * 구입 시 사용기한이 경과되어거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- * 이 제형의 내용물에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.
- * 이 사용설명서 개정년월(2017년 7월) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지(http://www.hyundapharm.co.kr)나 제품문의처 ☎ 1666-9979에서 확인하실 수 있습니다.

【제조(외국)지】 현대약품주식회사
충청남도 천안시 동남구 풍서면 강다리길 55
【제조지】 코스맥스(미국)이주회사
충청북도 제천시 바이오밸리길 30

☎ 제품문의처: 1666-9979
사용설명서 개정년월: 2017.07

