



제조업체명
명진제약주식회사

진료의약품

유턴® 16mg
유턴® 24mg

Betahistine HCl

U-Turn® Tab.

분류번호 : 11(진흔제)

【진료약품 및 그 분량】 1정 중

• 유턴정 16mg

유효성분 : 베타히스틴염산염(USP) 16mg
기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 폴리비드성아산화규소, 크로스카르멜로스나트륨, 크로스카르멜로스나트륨, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 적색40호, 폴리비드성아산화규소, 크로스카르멜로스나트륨, 포바논

• 유턴정 24mg

유효성분 : 베타히스틴염산염(USP) 24mg
첨가제(타르색소) : 적색40호
기타첨가제 : D-만니톨, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 적색40호, 폴리비드성아산화규소, 크로스카르멜로스나트륨, 포바논

【성상】

- | | |
|------------|-------------|
| • 유턴정 16mg | 흰색의 타원형 정제 |
| • 유턴정 24mg | 분홍색의 타원형 정제 |

【효능·효과】

메니에르병에 의한 어지러움, 이명, 청력 소실

【용법·용량】

성인 : 초기 용량으로 1회 베타히스틴염산염으로서 16 mg, 1일 3회 식사와 함께 경구투여합니다. 유지 용량으로 보통 1일 베타히스틴염산염으로서 24 ~ 48 mg를 투여합니다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 부신종양 환자
 - 크롬친화세포종 환자
 - 이 약의 성분에 과민증이 있는 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 소화성 궤양의 병력이 있는 환자 또는 활동성 소화성 궤양 환자
 - 전식 환자

- 3) 항히스타민제를 투여중인 환자
- 이상반응
 - 소화기계 : 소화불량 등이 나타날 수 있습니다. 베타히스틴염산염을 복용한 환자에서는 설사, 식욕부진, 복부팽만감 드물게 구역, 구토, 위통 등이 보고되었습니다.
 - 기타 : 두통, 가려움증, 피부발진 등이 나타날 수 있습니다. 베타히스틴염산염을 복용한 환자에서는 두드러기, 심계항진, 흉부감, 홍통, 발한, 일시적인 흥분성 발진 등이 보고되었습니다.
- 상호작용

항히스타민제와 병용시 이 약의 작용을 감소시킨다는 보고가 있으므로 신중히 투여합니다.
- 임부에 대한 투여

임신을 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유의성이 위험성을 상회하는 경우에만 투여합니다.
- 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않습니다(사용경험이 적습니다.).
- 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 용량을 감소하는 등 주의합니다.
- 과광투여시의 처리

과광투여가 드물게 보고되었습니다. 2명의 환자가 베타히스틴염산염으로서 200 mg 이상의 용량에서 일시적인 경도도 내지 중도도의 증상(강건조증, 부종, 혼란, 구역)을 경험하였습니다. 베타히스틴염산염으로서 728 mg를 복용한 경우 경증이 보고되었습니다. 모든 경우 과광투여시의 증상은 완전히 회복되었습니다.
- 과광투여시의 처리는 일반적인 보조 처치를 실시해야 합니다.
- 보관 및 취급상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
 - 햇빛 및 습도를 피하여 보관합니다.
 - 다른 용도에 바꾸어 쓰는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않습니다.

【저장방법】 차광기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 30정/병, 300정/병

【최신정보 확인방법】

설명서 개정일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

【제품문의처】

소비자 상담실 : 080-587-7575(수신자 요금부담)

- ※ 유통과정 중 사용기한이 경과되었거나 변질·변태 또는 오손된 제품은 약국개설자 및 의약품판매업자에 한하여 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다.

<http://www.mjunginph.co.kr>

설명서 개정년월 : 2017. 07
IUTR001001



제조판매명

명진제약주식회사

경기도 화성시 팔면면 노하길 361-12